HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW KARYA ILMIAII : JURNAL ILMIAII NASIONAL

Judul Karya Ilmiah (Artikel)	Potensi Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) Terhadap Pertumbuhan Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii							
Nama Penulis	: St. Ratnah, Alfrida Monica Salasa, Dwi Rachmawaty, Arisanty							
Jumlah Penulis	: 4 orang							
Status Pengusul	: penulis ke 3							
Identitas Jurnal/Artikel	a. Nama Jurnal	Media Farmasi						
	b. Nomor ISSN	p.issn 0216-2083 e.issn 2622-0962						
	c. Volume, Nomor, Bulan, Tahun	Vol. 18 No.1, April 2022						
	d. Penerbit	Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Makassar						
	e. DOI artikel (kalau ada)	https://doi.org/10.32382/mf.v17i2.2299						
,	f. Alamat web jurnal	https://journal.poltekkes- mks.ac.id/ojs2/index.php/mediafarmasi/is sue/view/139						
		https://journal.poltekkes- mks.ac.id/ojs2/index.php/mediafarmasi/ar ticle/view/2666/1796						
	g. Terindeks di	:https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/pr ofile/4825 sinta 5						
Kategori publikasi Jurnal								
Ilmiah	Jurnal Nasional Terakreditasi (pering	kat 1 dan 2)						
(beri √ pada kategori yang tepat)	Jurnal Nasional Bahasa Inggris (peris	ngkat 3 dan 4)						
- 1 2	√ Nasional Bahasa Indonesia (pering)							
	Nasional di luar peringkat							

Hasil penilaian Peer Review

	Hasii peniiaian Peer Ke		Nilai N	Aaksimal Jurnal Ilmi	ah	
Komponen yang dinilai		Nasional terakreditasi Peringkat (1 dan 2)	Nasional Bahasa Inggris Peringkat (3 dan 4)	Nasional Bahasa Indonesia Peringkat (5 dan 6)	Nasional di luar Peringkat	Nilai Akhir yang diperoleh
		Nilai maks 25	Nilai maks 20	Nilai maks 15	Nilai maks 10	
a.	Kelengkapan unsur isi jurnal ilmiah (10%)			1,5		(,z
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			4,5		4.2
C.				4,5		4,2
d.				4,5		4,1
To	tal = (100%)			15		14
Ni	ai Pengusul = 1/2 × 20 %	x 14 = 1.4	-			

Catatan Peer Reviewer:

1. Tentang Kelengkapan Unsur isi

Sistematika penulisan artikel sudah memenuhi kelengkapan unsurisi, abstrak menggunakan bahasa Indonesia yang baik, Isi antikel saling berhubungan mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan .

2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan

Awang lingkup penulisan sudah sesual distematika, merupakan antitel yang cukup update dibidangnya, kedalaman pembahasan sudah balk aldutung dengan artikel dan referensi yang relevan.

Kecukupan dan Kemutakhiran data / informasi dan metodologi kecukupan dan kemutokhiran data yang digunakan sudah baik, artikel yang digunatan sangat mendukung, metodologi artikel sudah sesuai untut mengukur dan menganalisis data dalam menjawah tujuan penelitian.

4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan kuanitas terbitan curup baik, penerbit antrel ini adalah Sumal Media Farmasi Yang telah telakteditasi sinta s.

Indikasi Plagiasi Tidak terdapat indikasi plagiosi, hasil pengeerkan aplikasi Tumitin sebesar 24 %.

6. Kesesuaian bidang ilmu karya limiah ini sesuai dengan bidang imu peneliti yakni famasi.

> Makassar, 15 September 2022 Reviewer 1

Nama

Dr. Rusli, Sp.FRS., Apt

NIP

19670506 199703 1 002

Unit Kerja

Poltekkes Kemenkes Makassar

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Bidang Ilmu

: Farmasi

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW KARYA ILMIAII 1 JURNAL ILMIAII NASIONAL

Judul Karya Ilmiah (Artikel)	Potensi Antibakteri Ekstrak Etanol Dau Terhadap Pertumbuhan Enterococcus fac	n Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) ecalis dan Citrobacter freundii							
Nama Penulis	: St. Ratnah, Alfrida Monica Salasa, Dw	: St. Ratnah, Alfrida Monica Salasa, Dwi Rachmawaty, Arisanty							
Jumlah Penulis	4 orang								
Status Pengusul	: penulis ke 3								
Identitas Jurnal/Artikel	a. Nama Jurnal	Media Farmasi							
	b. Nomor ISSN	p.issn 0216-2083 e.issn 2622-0962							
	c. Volume, Nomor, Bulan, Tahun	Vol. 18 No.1, April 2022							
	d. Penerbit	Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Makassar							
	e. DOI artikel (kalau ada)	https://doi.org/10.32382/mf.v17i2.2299							
	f. Alamat web jurnal	https://journal_poltekkes- mks.ac.id/ojs2/index.php/mediafarmasi/is sue/view/139							
		https://journal.poltekkes- mks.ac.id/ojs2/index.php/mediafarmasi/ar ticle/view/2666/1796							
	g. Terindeks di	:https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/pr ofile/4825 sinta 5							
Kategori publikasi Jurnal									
Ilmiah	Jurnal Nasional Terakreditasi (pering	gkat 1 dan 2)							
(beri √ pada kategori yang tepat)	Jurnal Nasional Bahasa Inggris (peris	ngkat 3 dan 4)							
	√ Nasional Bahasa Indonesia (peringk								
	Nasional di luar peringkat								

Hasil penilaian Peer Review

	Hasil penilaian Peer Re		Nilai N	Aaksimal Jurnal Ilmi	ah	
Komponen yang dinilai		Nasional terakreditasi Peringkat (1 dan 2)	Nasional Bahasa Inggris Peringkat (3 dan 4)	Nasional Bahasa Indonesia Peringkat (5 dan 6)	Nasional di luar Peringkat	Nilai Akhir yang diperoleh
		Nilai maks 25	Nilai maks 20	Nilai maks 15	Nilai maks 10	
a.	Kelengkapan unsur isi jurnal ilmiah (10%)			1,5		1,3
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			4,5		4,2
C.	Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)			4,5		4,4
d.	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)			4,5		4,2
To	tal = (100%)			. 15		14,1
	ai Pengusul = 1/2 x 20 %	x 14,1 = 1,41				

Catatan Peer Reviewer:

- Tentang Kelengkapan Unsur isi Isi artikel lengkap sesuai dengan panduan durnal dan isi saling bahubungan dari pandahuluan hingga kesimpulan
- 2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan Artikel yang update dibidangnya, pembahasan cutup bagus dan merujuk pada artikel yang sesuai
- 3. Kecukupan dan Kemutakhiran data / informasi dan metodologi Metode penelitian sudah sewai dengan topik penelitian dan Menghasilkan data yang representativ. Rugukan pustaka matakhir
- Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan Panduan manuscript jurnal ungkap dan jelas untuk dinguk. Jurnal trafreditasi anta 5
- 5. Indikasi Plagiasi Hasil progeuran aplikasi turnitin 24%
- Kesesuaian bidang ilmu Sehiai dingan bidang Ilmu peneliti

Makassar, 15 September 2022

Reviewer 2

Nama

Dr. Sesilia Rante Pakadang, M.Si., Apt

NIP

: 196909222000122001

Unit Kerja

: Poltekkes Kemenkes Makassar

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Bidang Ilmu

: Farmasi

SERTIFIKAT

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Kutipan dari Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 28/E/KPT/2019

Tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 5 Tahun 2019

Media Farmasi

E-ISSN: 26220962

Penerbit: Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Makassar

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 5

Akreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun, yaitu


Volume 14 Nomor 1 Tahun 2018 sampai Volume 18 Nomor 1 Tahun 2022

Jakarta, 26 September 2019

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Dr. Muhammad Dimyati NIP. 195912171984021001





P. ISSN No. 0216-2083 E-ISSN 2622-0962

MEDIA FARMASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MAKASSAR

Penasehat : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar

Penanggung Jawab : Ketua Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan

Kemenkes Makassar

Dewan Redaksi

Manajer : Santi Sinala, M.Si., Apt

Editor : Hendra Stevani, M.Kes., Apt.

Dr. Sisilia Rosmala Dewi M. Kes., Apt.

Muli Sukmawati, S.Farm.,Apt. Hesty Setiawati, S.Farm.,M.Si.

Risna, S.Farm., M.Si, Apt.

Hijrawaty Ayu Wardhani, S.Farm., M.Si.

Alamat Redaksi : Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Makassar

Jl. Baji Gau No.10 Makassar

Telp. 0411-854021, 830883 Fax. 0411-830883 e-mail: mediafarmasi@poltekkes-mks.ac.id

website http://journal.poltekkes-

mks.ac.id/ojs2/index.php/mediafarmasi/

Kode pos 90134

EDITORIAL

Pembaca yang budiman, ucapan syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya walaupun masih dalam masa wabah Covid 19 ini kami masih mampu menerbitkan Media Farmasi Vol. 18 No 1, April 2022, Media Farmasi telah mendapat legalitas sebagai media resmi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan nomor penerbitan ISSN P. ISSN No. 0216-2083 E-ISSN 2622-0962 dan telah terakreditasi SINTA Ristekdikti dan sementara dalam pengurusan indeksasi oleh DOAJ

Media Farmasi Politeknik Kesehatan Makassar merupakan suatu wadah dalam menampung aspirasi ilmiah terutama dalam bidang kefarmasian, baik Farmasi Komunitas, Farmasi Klinik, Maupun Farmasi Sains, dari teman-teman seminat Ilmu Farmasi di seluruh Indonesia.

Media Farmasi Politeknik Kesehatan Makassar berinisiatif untuk menambah jangkaun publikasi kami, salah satu caranya dengan memberikan setiap artikel abstrak berbahasa ingris yang telah di proofrading dengan baik oleh pihak yang kompeten

Akhirnya redaksi sangat berharap bahwa semua artikel yang disajikan dalam edisi ini dapat memberi apresiasi keilmuan di bidang kesehatan bagi kita semua. Oleh karena itu kritikan dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan edisi-edisi selanjutnya.

Selamat membaca

Makassar, April 2022

Redaksi

DAFTAR ISI

Efek Proteksi Madu Trigona Sp Pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) yang Diinduksi Atorvastatin Dengan Parameter Histopatologi Hati Mirnawati Salampe, Mutiara Mutiara, Sukamto S Mamada	1-9
Efektifitas Penyembuhan Luka Sayat Spray Gel Minyak Nilam Pada Kelinci (Oryctolagus cuniculus) Junvidya Heroweti, M Fatchur Rochman, Danang Novianto Wibowo, Isnina Rokhmatun Khasanah, Safira Salma	10-15
Suhu Dan Waktu Optimum Penyeduhan Simplisia Bunga Telang (Clitoria Ternatea L) Terhadap Kandungan Antioksidan Luluk - Anisyah, Ida Ayu Preharsini Kusuma, Lela Veronika Tindaon	16-19
Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Semangka (Citrullus Lanatus Linn) Dalam Sediaan Sirup Sebagai Imunostimulan Ermawati Ermawati, Ananda Ramadani	20-24
Aktivitas Antioksidan Kombinasi Seduhan Buas-Buas (Premna serratifolia Linn.), Meniran (Phyllanthus niruri L.), Secang (Caesalpinia sappan Linn.) Dan Rosela (Hibiscus sabdarifa) dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) isnindar. isnindar, Sri Luliana	25-29
Gambaran Penggunaan Fibrinolitik Pada Pasien Stemi (St-Segment Elevation Myocardial Infarction) Di Rumah Sakit "X" Di Kota Tarakan Marizka Anggreani, Irma Novrianti, Sari Wijayanti	30-35
Hubungan Usia, Pendidikan, dan Lama Bekerja dengan Pengetahuan Tenaga Kesehatan tentang Inkompatibilitas Sediaan Intravena Rizta Widya Pangestika	36-41
Formulasi Dan Stabilitas Mutu Fisik Sediaan Gel Wajah Yang Mengandung Ekstrak Daun Afrika Dengan Variasi Konsentrasi Carbopol Dwi Rachmawaty Daswi, Arisanty Arisanty, St Mutmainnah Dewi Reski, Alfrida Monica Salasa, St Ratnah	42-48
Evaluasi Penggunaan Obat Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya Kota Makassar Raimundus Chalik, Hidayati Hidayati, La Sakka, Haryuni Haryuni	49-59
Perbandingan Karakteristik Potensi Antibakteri Ekstrak Daun Dan Bunga Kemangi (Ocimum sanctum L) Terhadap Propionibacterium acnes Sesilia Rante Pakadang, Muhammad Anugerah Alam Waris, Kiki Arnalia Sari, Djuniasti Karim	60-66
Potensi Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) Terhadap Pertumbuhan Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii St. Ratnah, Alfrida Monica Salasa, Dwi Rachmawaty Daswi, Arisanty Arisanty	67-73

Perbandingan Kadar Flavonoid Simplisia Buah Pare (Momordica charantia L) Pada Temperatur 60°C, 80°C Dan 100°C Dengan Memakai Spektrofotometri Uv-Vis Sugiyanto Sugiyanto, Luluk - Anisyah	74-77
Formulasi Dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Masker Gel Ekstrak Daun Jeruk Purut (Citrus hystrix D.C) Nurhayana Nurhayana, Hendra Stevani, Hesty Setiawati, Ratna Sari Dewi	78-84
Formulasi Pasta Gigi Berbahan Aktif Herbal Kombinasi Ekstrak Daun Sirih Merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.) Dan Ekstrak Daun Mint (Mentha piperita) Sebagai Anti Mikroba Pada Gigi Dan Mulut Jumain Jumain, Syamsuddin Abubakar, Asmawati Asmawati	85-90
Perbandingan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanol Daun Ungu (Graptophyllum pictum 1. Griff) Berdasarkan Perbedaan Metode Pengeringan Dyah Ratna Ayu Puspita Sari, Putu Ayu Ratih Listiani, Putu Ayu Ratih Listiani	91-96
Efek Kombinasi Ekstrak Daun Kumis Kucing (Orthosipon aristatus) Dan Daun Sirsak (Annona muricata L.) Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Mencit (Mus musculus) Irenewati Somalangi, Sisilia Rosmala Dewi, Santi Sinala	97-103
Effect Of Extract Breadfruit Leaf (Artocarpus altilis (Park.) Fosberg) Toward Tumor Necrosis Factor (TNF-α) In Obese Rat (Rattu norvegicus) With Insulin Resistance Wahyudin Wahyudin, Hasanuddin Nuru, Hendra Stevani, Salmah Arafah	104-108



Media Farmasi

Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar

Jl Baji Gau No 10 Makassar, 90134 Telp 0411 854021





POTENSI ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN PEGAGAN (Centella asiatica (L.) Urban) TERHADAP PERTUMBUHAN Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii

Potential Anti-Bacterial Ethanol Extract Of Collature Leaves (Centella asiatica (L.) Urban) On The Growth Of Enterococcus faecalis and Citrobacter freundii

St. Ratnah, Alfrida Monica Salasa*, Dwi Rachmawaty Daswi, Arisanty Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar

*Koresponden Email: alfrida.monica@poltekkes-mks.ac.id

DOI: https://doi.org/10.32382/mf.v18i1.2666

Date submitted 2022-02-07, Accept Submission 2022-04-26

ABSTRACT

Enterococcus faecalis and Citrobacter freundii are bacteria that can be found in the digestive sistem like Escherichia coli and can enter the digestive tract with food and drinks containing these bacteria. The phytochemical content of Pegagan Leaves (Centella asiatica (Linn.) Urban) is tannins, flavonoids, steroids, terpenoids, and alkaloids, which have been shown to have antibacterial activity. The purpose of this study was to determine the antibacterial potential of the ethanol extract of Pegagan Leaf (Centella asiatica (L.) Urban.) on the growth of Enterococcus faecalis and Citrobacter freundii. Pegagan leaf simplicia was extracted using the maceration method with 96% ethanol as a solvent, then tested for its antibacterial potential using the disc diffusion method. The results showed that the optimal concentration of ethanol extract of Gotu kola for both test bacteria was 8%. The conclusion of this study, ethanol extract of Pegagan Leaf has antibacterial potential against Enterococcus faecalis and Citrobacter freundii.

Keywords: Gotu Kola Leaf; Enterococcus faecalis and Citrobacter freundii; Antibacterial potential

ABSTRAK

Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii merupakan bakteri yang dapat ditemukan dalam sistem pencernaan sama seperti Escherichia coli dan dapat memasuki saluran pencernaan bersama makanan dan minuman yang mengandung bakteri tersebut. Kandungan fitokimia dari Daun Pegagan (Centella asiatica (Linn.) Urban) yaitu tannin, flavonoid, steroid, terpenoid, dan alkaloid, yang telah terbukti memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan potensi antibakteri ekstrak etanol Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban.) terhadap pertumbuhan Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii. Simplisia Daun Pegagan diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan etanol 96% sebagai cairan penyari, kemudian diuji potensi antibakterinya dengan metode disc diffution. Hasil menunjukkan bahwa konsentrasi optimal ekstrak etanol Daun Pegagan untuk kedua bakteri uji adalah 8%. Kesimpulan dari penelitian ini, ekstrak etanol Daun Pegagan memiliki potensi antibakteri terhadap Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii.

Kata Kunci: Daun Pegagan; Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii; Potensi antibakteri

PENDAHULUAN

Penyakit menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme tertentu atau toksin yang dihasilkannya yang ditularkan melalui orang yang terinfeksi, binatang yang menjadi reservoir ke orang-orang yang rentan. Penularan ini terjadi baik langsung maupun tidak langsung melalui tumbuhan, binatang penjamu, vektor lain ataukah melalui lingkungan. Penyakit menular atau lebih dikenal sebagai penyakit infeksi diantaranya adalah penyakit menular langsung seperti diare. Diare merupakan salah penyakit yang menyerang pencernaan (Dinkes Prov. Sulawesi Selatan, 2015). Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh dicerna melalui sistem pencernaan. Dengan demikian, sistem pencernaan ini termasuk organ yang sangat vital bagi tubuh. Oleh karena itu, Kesehatan bagian ini harus senantiasa dijaga (Soepomo, 2013).

Flora normal dalam saluran pencernaan memiliki faktor virulensi ekstra yang membuatnya bersifat patogenik. Dalam keadaan normal, flora normal ini umumnya tidak patogen tetapi dapat menjadi patogen oportunistis apabila infeksi menyebabkan perubahan fisiologi pada tubuh normal. Mikroorganisme akan berubah menjadi patogen apabila jumlahnya bertambah di dalam tubuh. Masuknya mikroorganisme ke dalam saluran pencernaan dapat melalui

makanan dan minuman ataukah melalui jari tangan yang terkontaminasi. Mikroorganisme yang dapat ditemukan pada saluran pencernaan diantaranya *Enterococcus faecalis* dan *Citrobacter freundii* (Pratiwi, 2008).

Menurut Golob et al., (2019), Enterococcus faecalis ditemukan pada daging sapi dan babi serta isolat sampel klinis manusia. Bakteri ini juga dapat ditemukan pada rongga mulut, terutama pada infeksi edodontik sekunder (Bernardi et al., 2021). Enterococcus faecalis juga ditemukan dalam feses kucing secara molekuler yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan gen 16S rRNA sebagai penanda (Mende, Pelealu and Kolondam, 2019). Citrobacter freundii merupakan flora normal pada saluran usus manusia dan hewan, namun dapat juga menyebabkan diare dan infeksi lain pada manusia (Liu et al., 2018). Menurut Bai et al., (2012) dan Liu et al., (2018), Citrobacter freundii merupakan penyebab diare yang jarang terjadi tetapi dipastikan menyebabkan penyakit ini pada manusia. Penelitian-penelitian ini membuktikan bahwa kedua bakteri tersebut terdapat dalam saluran pencernaan dan dapat menyebabkan diare sama seperti Escherichia coli. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sandy et al., 2021), bahwa Daun Pegagan memiliki aktivitas antibakteri terhadap sehingga menjadi dasar Escherichia coli pemilihan tanaman ini untuk diuji potensi antibakterinya terhadap Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii.

Pengobatan penyakit di masyarakat umumnya masih secara turun temurun menggunakan ramuan obat-obatan disediakan oleh alam sekitar sebagai alternatif untuk mengatasi masalah kesehatan saat ini. Tumbuhan memiliki potensi sebagai obat tradisional. berdasarkan habitusnya herba merupakan habitus yang paling sering digunakan, bagian dari tumbuhan yang paling sering digunakan adalah daun. Apiaceae merupakan salah satu familia yang sudah biasa digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi penyakit infeksi pada sistem pencernaan (Ningsih et al., 2020). Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) termasuk famili Apiaceae yang memiliki potensi antibakteri terhadap Escherichia coli yang merupakan bakteri flora normal pada sistem pencernaan Enterococcus faecalis dan sama seperti Citrobacter freundii (Sandy et al., 2021). Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan

penelitian mengenai skrining fitokimia dan uji potensi antibakteri ekstrak etanol Daun Pegagan (*Centella asiatica* (L.) Urban) terhadap *Enterococcus faecalis* dan *Citrobacter freundii*.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah ekstrak etanol Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban.) memiliki potensi sebagai antibakteri terhadap pertumbuhan Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan potensi antibakteri ekstrak etanol Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban.) terhadap pertumbuhan Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii.

METODE

Desain, tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilaksanakan di laboratorium Mikrobiologi dan Fitokimia Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar, dari bulan Januari sampai Februari 2022.

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini berupa alat-alat gelas, maserator, batang pengaduk, rotary evavaporator, hot plate, autoklaf, oven, laminary air flow, incubator, waterbath. Bahan-bahan yang digunakan berupa simplisia Daun Pegagan, etanol 96%, aquadest, Na. CMC, media Nutrient Agar (Merck), Mueller Hinton Agar (Merck), Pepton Water (Merck), paper disc, biakan Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii.

Prosedur Penelitian Pembuatan Simplisia

Daun Pegagan dipisahkan dari kontaminasi bahan asing dan bagian dari tanaman yang tidak diperlukan, kemudian dicuci dengan air mengalir. Selanjutnya daun ditiriskan, dipotong-potong kecil dengan lebar kira-kira 2 cm. Langkah selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara diangin-anginkan atau dikeringkan dengan oven. Selanjutnya dilakukan sortasi kering (Balitbang, 2011).

Ekstraksi

Simplisia kering Daun Pegagan ditimbang dan dimasukkan ke dalam bejana maserator, ditambahkan etanol 96 % sampai selapis di atasnya. Direndam selama 5 hari ditempatkan pada ruang yang terlindung dari paparan sinar matahari langsung dan sesekali diaduk. Setelah 5 hari filtrat disaring, ampas diperas. Proses maserasi diulangi sampai 3 kali. Ekstrak yang diperoleh didiamkan selama 2 hari

kemudian diuapkan dengan *rotary evaporator*. Ekstrak kental dikeringkan menggunakan *waterbath* hingga diperoleh ekstrak kering.

Skrining Fitokimia

Alkaloid

Ekstrak 3 ml + 5 ml HCl 1% lalu dilakukan pemanasan dalam waktu 20 menit. Apabila sudah dingin, maka akan dilakukan penyaringan . 1 ml filtrat + asam pikrat, akan memiliki bentuk larutan keruh maupun endapan

Ekstrak + NH₄OH hingga menjadi basa kemudian + 10 ml (kloroform : air = 1:1) dan dikocok. Lapisan kloroform + 3 tetes Wagner P terbentuk endapan merah coklat

Ekstrak + NH₄OH sampai basa terbentuk lalu + 10 ml (kloroform : air =1:1) dan dikocok. Lapisan kloroform + Mayer P memiliki bentuk endapan putih

Tanin

Ekstrak 1 ml + 3 tetes FeCl₃ memiliki bentuk endapan hijau – biru hitam

Saponin

Ekstrak 1 ml + 10 ml air kemudian dikocok kuat akan terbentuk busa stabil. Tambahkan 1 tetes HCL 2 N dinyatakan positif apabila buih tidak hilang

Flavonoid

Ekstrak 3 ml + 1 ml NaOH 10% terbentuk warna kuning.

Ekstrak + HCl kemudian + serbuk Mg kocok akan terbentuk warna kuning-jinggamerah-ungu. Akan ada warna jingga maupun merah yang menggambarkan flavon, flavanol jika terbentuk larutan berwarna merah hingga merah padam, jik terbentuk warna merah padam hingga merah keunguan menggambarkan flavanon.

Glikosida

Ekstrak 1 ml + 10 ml H₂SO₄ 50% kemudian dipanaskan selama 15 menit. Selanjutnya + larutan Fehling serta melakukan pemanasan sampai memiliki bentuk endapan merah bata

Steroid

Ekstrak 1 ml + 10 ml H₂SO₄ pekat memiliki bentuk larutan kemerahan

Terpenoid

Ekstrak 1 ml + 3 tetes HCl pekat + 1 tetes H₂SO₄ pekat memiliki bentuk warna ungu atau merah

Antrakuinon

Ekstrak + benzene 10 ml lalu dilakukan penyaringan. Filtrat + 0,5 ml ammonia. Campuran kemudian dilakukan pengocokkan dengan kuat, serta akan memiliki bentuk warna ungu pada fase layer

Sterilisasi Alat

Alat-alat gelas yang terdiri dari cawan petri serta tabung reaksi disterilisasi dengan menggunakan oven, suhu 180°C selama 2 jam. Ose dan pinset disterilkan dengan pemijaran menggunakan lampu spiritus.

Penyiapan Media

Pepton Water

Ditimbang 2,55 g pepton water (Merck) dilarutkan dengan aquadest sebanyak 100 ml, selanjutnya disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit

Nutrien Agar

Ditimbang serbuk Nutrien Agar (*Merck*) sebanyak 2 g dilarutkan dengan 100 ml aquadest, dipanaskan di atas api hingga larut. Disteril menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

Mueller Hinton Agar

Sebanyak 6,8 g serbuk MHA (*Merck*) ditimbang kemudian ditambahkan 200 ml aquadest, dipanaskan hingga larut. Media selanjutnya disterilkan di autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

Penyiapan Bakteri Uji Peremajaan Bakteri Uji

Enterococus faecalis dan Citrobacter freundii dari stok murni diinokulasi ke media Pepton Water, diinkubasi selama 1 x 24 jam dengan suhu 37°C. Selanjutnya diinokulasi ke media miring Nutrien Agar, dimasukkan ke dalam incubator suhu 37°C selama 24 jam.

Penyiapan Suspensi Bakteri

Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii yang sudah diremajakan diambil 1 ose kemudian disuspensikan ke dalam air steril, dikocok sampai homogen, Tingkat kekeruhan yang diperoleh sama dengan McFarland 0,5.

Penyiapan Ekstrak

Ekstrak Daun Pegagan dibuat konsentrasi 2%, 4% dan 8% b/v dengan cara disuspensikan dengan Na CMC 1% yang sudah disterilkan.

Pengujian Potensi Antibakteri

Cawan petri yang sudah steril diisi dengan $Mueller\ Hinton\ Agar\ (MHA)$ yang juga sudah disterilkan sebanyak $\pm\ 20$ ml, dibiarkan memadat. $Paper\ disc$ direndam dengan ekstrak etanol Daun Pegagan 2%, 4%, 8% dan Na. CMC sebagai kontrol negatif. Bakteri uji diulas pada permukaan media MHA secara merata menggunakan swab steril, dibiarkan selama $\pm\ 15$ menit. Diletakkan $paper\ disc\ yang\ sudah$ direndam dengan ekstrak tanaman dan sudah

ditiriskan, diatur sedemikian rupa. Dimasukkan ke dalam inkubator pada suhu 37°C selama 24 jam. Diamati dan diukur diameter zona hambat. Replikasi pengujian dilakukan sebanyak 5 kali.

HASIL

Penelitian dimulai dengan pembuatan simplisia kering Daun Pegagan kemudian dilakukan proses ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan etanol 96% sebagai cairan penyari. Untuk mengetahui kandungan fitokemikal dilakukan skrining fitokimia (tabel1).

Tabel 1. Hasil Uji Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban)

Bahan Uji	Bahan Uji Kandungan senyawa kimi							
	Tanin	Flavonoid	Steroid	Terpenoid	Glikosida	Alkaloid	Saponin	Antrakuinon
Ekstrak Etanol Daun Pegagan	+	+	+	+	-	+	-	-

Pengujian dilanjutkan dengan uji potensi antibakteri terhadap *Enterococcus faecalis* dan *Citrobacter freundii*. Kedua bakteri ini terdapat di dalam sistem pencernaan dan masuk ke dalam tubuh bersama makanan dan minuman yang tercemar dengan bakteri tersebut. Uji potensi dapat ditentukan denga mengukur luas diameter zona hambat (Tabel 2)

Tabel 2. Hasil Pengujian Potensi Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pegagan (*Centella asiatica* (L.) Urban) terhadap Pertumbuhan *Enterococcus faecalis* dan *Citrobacter freundii*

Bakteri Uji	Replikasi	Diamete	er Zona H	ona Hambat Pertumbuhan (mm)			
		2%	4%	8%	Kontrol (-)		
Enterococcus faecalis	1	10,10	12,10	15,50	0,00		
	2	10,00	13,00	16,00	0,00		
	3	7,00	9,00	15,00	0,00		
	4	8,00	10,20	14,00	0,00		
	5	7,10	10,10	15,10	0,00		
	Rerata	8,44	10,88	15,12	0,00		
Citrobacter freundii	1	10,00	12,00	14,10	0,00		
	2	10,10	12,10	14,00	0,00		
	3	11,00	13,10	18,00	0,00		
	4	11,10	13,00	16,00	0,00		
	5	9,00	11,00	15,00	0,00		
	Rerata	10,24	12,24	15,42	0,00		

Tabel 3. Hasil Analisis Mann Whiney Uji Potensi Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pegagan (*Centella asiatica* (L.) Urban) terhadap Pertumbuhan *Enterococcus faecalis*

Perlakuan bahan uji	n	Zona hambat pertumbuhan bakteri uj							
vanan uji		Mean	Std. dev	Median	Min	Max			
EDP 2%	5	8,4400	1,52086	8,0000ª	7,00	10,10			
EDP 4%	5	10,8600	1,63951	10,2000 a	9,00	13,00			
EDP 8%	5	15,1200	0,72959	15,1000	14,00	16,00			

Superscript ^a menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar kelompok (berdasarkan uji Mann Whitney dengan nilai p<0,05).

Tabel 4. Hasil Analisis Mann Whiney Uji Potensi Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pegagan (*Centella asiatica* (L.) Urban) terhadap Pertumbuhan *Citrobacter freundii*

Perlakuan bahan uji	n	Zona hambat pertumbuhan bakteri uji						
banan uji		Mean	Std. dev	Median	Min	Max		
EDP 2%	5	10,2400	0,85615	10,1000	9,00	11,10		
EDP 4%	5	12,2400	0,85615	12,1000	11,00	13,10		
EDP 8%	5	15,4200	1,65289	15,0000	14,00	18,00		

PEMBAHASAN

Centella asiatica (L.) merupakan tanaman dengan habitus herba dan tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis (Singh et al., 2010). Di Indonesia, masyarakat mengenal tanaman ini dengan nama pegagan. Pada penelitian ini diguanakan bagian daun dari Pegagan sebagai bahan uji, hal ini berdasarkan pada penelitian (Ningsih et al., 2020), bahwa berdasarkan habitusnya, tumbuhan yang paling banyak digunakan sebagai obat tradisional adalah herba, sedangkan menurut bagian tanaman yang paling sering digunakan adalah daun. Daun Pegagan memiliki aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli (Sandy et al., 2021), yang merupakan salah satu bakteri yang hidup di saluran pencernaan. Selain itu, bakteri yang terdapat pada saluran pencernaan diantaranya adalah Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii. Sama seperti Escherichia coli, kedua bakteri ini merupakan flora normal saluran pencernaan dan masuk ke dalam tubuh bersama makanan dan minuman yang sudah tercemar (Pratiwi, 2008). Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan potensi antibakteri ekstrak etanol Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) terhadap Pertumbuhan *Enterococcus faecalis* dan *Citrobacter freundii* berdasarkan adanya diameter zona hambat.

Daun Pegagan memiliki tekstur yang lunak sehingga senyawa fitokimianya dapat diekstraksi dengan metode maserasi, dengan menggunakan etanol 96% sebagai cairan penyari. Maserasi merupakan metode ekstraksi secara dingin yang digunakan untuk simplisia yang memiliki tekstur lunak. Pemilihan etanol sebagai cairan penyari karena bersifat universal dan tidak toksik (Depkes RI, 1986).

Pengujian potensi antibakteri dilakukan menggunakan metode disc diffution, dengan konsentrasi ekstrak 2%, 4%, dan 8% yang disuspensikan dengan Na. CMC 1% sehingga digunakan sebagai kontrol negatif. Hasil pengamatan ketiga konsentrasi menunjukkan adanya potensi antibakteri terhadap kedua jenis bakteri yang diuji yang ditandai dengan terbentuknya zona jernih di sekitar paper disc yang menandakan tidak adanya pertumbuhan bakteri di area tersebut. Zona hambat yang terbentuk setelah lebih 24 jam perlahan mengecil dan kemudian ditumbuhi bakteri. Hal ini menandakan bahwa ekstrak etanol Daun Pegagan bersifat sebagai bakteriostatik. Anti

mikroba dinyatakan hanya bersifat menghambat (bakteriostatik) apabila antibakteri tersebut menunjukkan adanya diameter zona hambat di sekitar area obat tetapi akan semakin mengecil seiring berkurangnya kadar obat. Dengan kata suatu antibakteri hanya bersifat bakteriostatik (menghambat) pertumbuhan bakteri jika pemberian senyawa terus dilakukan dan bakteri akan tumbuh kembali jika pemberian obat dihentikan atau habis yang dapat diamati dengan berkurangnya diameter zona hambat seiring dengan bertambahnya masa inkubasi. Sebaliknya apabila diameter zona hambat semakin luas pada inkubasi hari berikutnya maka antibakteri tersebut dinyatakan bersifat bakterisida atau memiliki kemampuan membunuh bakteri. Hal ini disebabkan karena mampu membunuh senvawa ini menghentikan aktivitas fisiologis dari bakteri, meskipun pemberian senyawa tersebut dihentikan (Mycek, 2001). Pada penelitian ini digunakan 3 konsentrasi yaitu 2%, 4% dan 8% dengan replikasi sebanyak 5 kali sehingga diperoleh hasil yang valid. Berdasarkan hasil statistic Mann Whitney (dengan nilai p<0,05), aktivitas antibakteri ekstrak Daun Pegagan terhadap Enterococcus faecalis pada konsentrasi 2% dan 4% tidak memiliki perbedaan yang signifikan tetapi memiliki aktivitas yang berbeda dengan 8%. Aktivitas antibakteri terhadap Citrobacter freundii terdapat perbedaan yang signifikan terhadap ketiga konsentrasi yang digunakan. Konsentrasi yang paling optimal dalam menghambat pertumbuhan Enterococcus faecalis maupun Citrobacter freundii adalah 8 % (tabel 3 dan 4), data dari hasil pengamatan menunjukkan diameter zona hambat terluas adalah 8% (tabel 2). Penelitian ini sejalan dengan pengujian antibakteri yang dilakukan oleh (Setiawan, Fatriadi and Prisinda, 2020) dengan menggunakan ekstrak etanol Daun Kemangi terhadap Enterococcus faecalis konsentrasi yang lebih tinggi menghasilkan diameter zona hambat yang hampir sama dengan ekstrak Daun Pegagan. Begitu pula dengan aktivitas antibakteri terhadap Citrobacter freundii yang dilakukan oleh (Buyun, 2019) menggunakan Ekstrak Daun Begonia memperlihatkan diameter zona hambat yang lebih luas dengan konsentrasi yang lebih tinggi. ekstrak ini memiliki kesamaan kandungan fitokemikal yaitu flavonoid.

Ekstrak Daun Pegagan memiliki potensi antibakteri terhadap *Enterococcus faecalis* dan

Citrobacter freundii karena mengandung senyawa fitokimia yaitu tannin, flavonoid, steroid, terpenoid dan alkaloid (tabel 1). Tannin dapat mendenaturasi protein sel bakteri, melakukan penghambatan terhadap fungsi membran sel sehingga mengganggu proses transpor antar sel, serta mengganggu pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat sintesis asam nukleat. Flavonoid memiliki untuk membentuk kemampuan senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler kemudian larut dan selanjutnya akan membentuk kompleks dengan dinding sel bakteri dan menyebabkan terjadinya kerusakan pada dinding sel bakteri sehingga senyawa intraseluler akan keluar. Flavonoid juga dapat menghambat pembentukan DNA dan RNA dengan cara menumpuk asam basa nukleat pada proses pengikatan hidrogen, senyawa ini juga dapat mengganggu aktivitas antibakteri dan protein ekstraseluler dengan cara mencegah pembentukan energi pada membran sitoplasma dan menghambat motilitas bakteri. Steroid memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan membran fosfolipid sehingga dapat menyebabkan menurunnya integritas membran sel terganggunya morfologi sel sehingga mengakibatkan lisisnya sel. Terpenoid memiliki kemampuan untuk berikatan dengan protein transmembran yang disebut porin, ikatan polimer ini sangat kuat sehingga menyebabkan kerusakan porin yang merupakan tempat keluar masuknya senyawa. Kerusakan ini akan menyebabkan berkurangnya permeabilitas dinding sel dan berakibat terhadap berkurangnya nutrisi akhirnya menyebabkan terhambatnya pertumbuhan bakteri. Penghambatan pertumbuhan bakteri oleh alkaloid adalah mengganggu pembentukan dinding sel dengan mengganggu komponen penyusun peptidoglikan, sehingga dapat menyebabkan kematian sel (Cowan, 1999).

Berdasarkan data yang diperoleh, ekstrak etanol Daun Pegagan memiliki potensi sebagai antibakteri terhadap *Enterococcus faecalis* dan *Citrobacter freundii*. Hasil ini menambah data ilmiah mengenai efek farmakologik khususnya antibakteri dari tanaman ini.

KESIMPULAN

Ekstrak etanol Daun Pegagan (*Centella asiatica* (L.) Urban) memiliki potensi antibakteri terhadap *Enterococcus faecalis* dan *Citrobacter freundii*.

SARAN

Sebaiknya dilakukan pengujian kadar kandungan total kandungan senyawa dari ekstrak untuk mendukung aktivitas antibakteri tanaman tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Bai, L. et al.. 2012 Isolation and characterization of cytotoxic, aggregative citrobacter freundii, PLoS ONE, (7.3). doi: 10.1371/journal.pone.0033054.
- Balitbang. 2011. Balai Besar Litbang. 2011. Pedoman Umum Panen dan Pascapanen Tanaman Obat. Kemenkes RI, Journal of Chemical Information and Modeling, 53.9), pp. 1689–1699.
- Bernardi, S. et al.. 2021 Subinhibitory antibiotic concentrations enhance biofilm formation of clinical enterococcus faecalis isolates, Antibiotics, 10(7). doi: 10.3390/antibiotics10070874.
- Buyun, L. 2019 Screening for Antimicrobial Activity of Nine Ethanolic Extracts Obtained from Leaves of Begonia Plant: a Possible Alternative in the Treatment of Infections Caused by Citrobacter Freundii, pp. 312–322. doi: 10.15414/agrobiodiversity.2019.2585-8246.312-322.
- Cowan, M. M. 1999 Plant Products as Antimicrobial Agents, Clinical Microbiology Reviewes, 12.
- Depkes RI 1986 *Sediaan Galenik*. Jakarta: Dirjen POM.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2015 Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan., Dinas Kesehatan, Jakarta
- Golob, M. et al. 2019 Antimicrobial Resistance and Virulence Genes in Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis from Humans and Retail Red Meat, BioMed Research International, 2019, pp. 14–16. doi: 10.1155/2019/2815279.
- Liu, Liyun et al. 2018 Genetic diversity, multidrug resistance, and virulence of citrobacter freundii from diarrheal patients and healthy individuals,

- Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 8(JUL), pp. 1–10. doi: 10.3389/fcimb.2018.00233.
- Mende, P. S., Pelealu, J. and Kolondam, B. 2019
 Identifikasi Molekuler Bakteri Dalam
 Feses Kucing (Felis Domestica) Yang
 Ditumbuhkan Pada De Mann Rogosa
 Sharpe Agar (Mrsa) Molecular
 Identification Of Bacteria In Cat Felis
 domestica) Feces Grown On De Mann
 Rogosa Sharpe Agar, 8, Pp. 73–78.
- Mycek, M. 2001 Farmakologi; Ulasan Bergambar. 2nd edn. Jakarta: Widya Medika.
- Ningsih, K. et al. 2020 Studi Pemanfaatan Tumbuhan Obat Berpotensi Mengobati Pada Penyakit Pada Penyakit Sistem Pencernaan Di Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Jurnal Hutan Lestari, 8(2), pp. 217–228. doi: 10.26418/jhl.v8i2.39782.
- Pratiwi, S. T. 2008 *Mikrobiologi Farmasi*. Yogyakarta: Erlangga.
- Sandy, M. et al. 2021 Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak, Fraksi n-Heksan, Faksi Etil Asetat, Fraksi Air Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urb) Terhadap Escherichia coli ATCC 25922, Media Farmasi Indonesia, 16(2), pp. 1683– 1692.
- Setiawan, A. S., Fatriadi, F. and Prisinda, D. 2020 Aktivitas Antibakteri Fraksi Etanol Daun Kemangi (Ocimum americanum) Terhadap Enterococcus faecalis ATCC 29212, ODONTO: Dental Journal, 7(2), p. 111. doi: 10.30659/odj.7.2.111-116.
- Singh, S. et al. 2010 Centella asiatica (L.): A plant with immense medicinal potential but threatened, International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 4(2), pp. 9–17.
- Soepomo, P. 2013 Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Saluran Pencernaan Menggunakan Metode Dempster Shafer, JSTIE (Jurnal Sarjana Teknik Informatika) (E-Journal), 1(1), pp. 32–41. doi: 10.12928/jstie.v1i1.2502.



2 by Ratnah Ratnah

Submission date: 12-May-2022 03:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 1834487070

File name: Turnitin_MF_April_2022.docx (54.17K)

Word count: 3146 Character count: 20241

POTENSI ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN PEGAGAN (Centella asiatica (L.) Urban) TERHADAP PERTUMBUHAN Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii

St. Ratnah, Afrida Monica Salasa*, Dwi Rachmawaty Daswi, Arisanty Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar

*Koresponden Email: alfrida.monica@poltekkes-mks.ac.id (081342962441)

ABSTRAK

Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii merupakan bakteri yang dapat ditemukan dalam system pencernaan sama seperti Escherichia coli dan dapat memasuki saluran pencernaan bersama makanan dan minuman yang mengandung bakteri tersebut. Kandungan fitokimia dari Daun 11 agan (Centella asiatica (Linn.) Urban) yaitu tannin, flavor d, steroid, terpenoid, dan alkaloid, yang telah terbukti memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan potensi antibakteri ekstrak etanol Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban.) terhadap pe 12 mbuhan Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii. Simplisia Daun Pegagan diekstraksi menggunakan m d bde maserasi dengan etanol 96% sebagai cairan penyari, kemudian diuji potensi antibakterinya dengan metode disc diffution. Hasil menunjukkan bahwa konsentrasi optimal ekstrak etanol Daun Pegagan untuk kedua bakteri uji adalah 8%. Kesimpulan dari penelitian ini, ekstrak etanol Daun Pegagan memiliki potensi antibakteri terhadap Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii.

Kata Kunci : Daun Pegagan, Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii, Potensi antibakteri

PENDA ULUAN

Penyakit menular merupakan penyakit yang a sebabkan oleh mikroorganisme tertentu atau toksin yang dihasilkannnya yang ditularkan melalui orang yang a infeksi, binatang yang menjadi reservoir ke orang-orang yang rentan. Penularan ini terjadi baik langsung maupun tidak langsung melalui tu a uhan, binatang penjamu, vector lain ataukah melalui lingkungan. Penyakit menular lebih dikenal sebagai penyakit infeksi diantaranya adalah penyakit menular langsung seperti diare. Diare merupakan sepi satu penyakit yang menyerang system pencernaan (Dinkes Prov. Sulawesi Selatan, 2015). Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh dicerna melalui system pencernaan. Dengan demikian, system pencernaan ini termasuk organ yang sangat vital bagi tubuh. Oleh karena itu, Kesehatan bagian ini harus senantiasa dijaga (Soepomo, 2013).

Flora normal dalam saluran pencernaan memiliki factor virulensi ekstra yang membuatnya bersifat patogenik. Dalam keadaan normal, flora normal ini umumnya tidak pathogen tetapi dapat menjadi pathogen oportunistik apabila infeksi menyebabkan perubahan fisiologi pada tubuh normal. Mikroorganisme akan berut menjadi pathogen apabila jumlahnya bertambah di dalam tubuh. Masuknya mikroorganisme ke dalam saluran pencernaan dapat melalui makanan dan minuman ataukah melalui jari tangan yang terkontaminasi. Mikroorganisme yang dapat ditemukan pada saluran pencernaan diantaranya Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii (Pratiwi, 2008).

Menurut (Golob et al., 2019), Enterococcus faecalis ditemukan pada daging sapi dan babi serta isolate sampel klinis manusia. Bakteri ini juga dapat ditemukan pada rongga mulut, terutama pada infeksi edodontik sekunder (Bernardi et al., 2021). Enterococcus faecalis juga ditemukan dalam feses kucing secara molekuler yang dapat diidentifikasi dengan menggunak 2 gen 16S rRNA sebagai penanda (Mende, Pelealu and Kolondam, 2019). Citrobacter freundii merupakan flora normal pada salura 29 sus manusia dan hewan, namun dapat juga menyebabkan diare dan infeksi lain pada manusia (Liu et al., 2018). Menurut (Bai et al., 2012) dan (Liu et al., 2018), Citrobacter freundii merupakan penyebab diare yang jarang terjadi tetapi dipastikan menyebabkan penyakit ini pada manusia. Penelitian-penelitian ini membuktikan bahwa kedua bakteri tersebut terdapat dalam

saluran pencernaan dan dapat menyebabkan diare sama seperti Escherichia coli. Hal ssesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sandy et al., 2021), bahwa Daun Pegagan memiliki aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli sehingga menjadi dasar pemilihan tanaman ini untuk diuji potensi antibakterinya terhadap Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii.

Pengobatan penyakit di masyarakat umumnya masih secara turun temurun menggunakan ramuan obat-obatan yang disediakan oleh alam sekitar sebagai alternatif untuk mengatasi masalah kesehatan saat ini. Tumbuhan memiliki potensi sebagai 13at tradisional, berdasarkan habitusnya herba merupakan habitus yang paling sering digunakan, bagian dari tumbuhan 36g paling sering digunakan adalah daun. Apiaceae merupakan salah satu familia yang sudah biasa digunakan sebagai 18at tradisional untuk mengatasi penyakit infeksi pada system pencernaan (Ningsih et al., 2020). Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) termasuk famili Apiaceae yang memiliki potensi antibakteri terhadap Escherichia coli yang merupakan bakteri flora normal pada sys 25 pencernaan sama seperti Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii (Sandy et al., 2021). Be 3 sarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian mengenai skrining fitokimia dan uji potensi antibakteri ekstrak etanol Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) terhadap Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii. 10

Rumusan mas 11 h dari penelitian ini adalah apakah ekstrak etanol Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban.) memiliki pensi sebagai antibakteri terhadap pertumbuhan Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan potensi antibakteri ekstrak etanol Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban.) terhadap pertumbuhan Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii.

1 METODE

Desain, tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilaksanakan di laboratorium Mikrobiologi dan Fitokimia Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar, dari bulan Januari sampai Februari 2022.

16

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunak pada penelitian ini berupa alat-alat gelas, maserator, batang pengaduk, rotary evavaporator, hot plate, autoklaf, oven, laminary air flow, incubator, waterbath.

2 han-bahan yang digunakan berupa simplisia Daun Pegagan, etanol 96%, aquadest, Na. CMC, media Nutrient Agar (merck), Mueller Hinton Agar (merck), Pepton Water (merck), paper disc, biakan Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii.

Prosedur Penelitian Pembuatan Simplisia

Daun Pegagan dipisahkan dari kontaminasi bahan asing dan bagian dari tanaman yang tidak diperlukan, kemudian dicuci dengan air mengalir. Selanjutnya daun ditiriskan, dipotong-potong kecil dengan lebar kira-kira 2 cm. Langkah selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara dianginanginkan atau dikeringkan dengan oven. Selanjutnya dilakukan sortasi kering (Balitbang, 2011).

Ekstraksi

Simplisia kering Daun Pegagan ditimbang dan dimasukkan ke dalam bejana maserator, mbahkan etanol 96 % sampai selapis di atasnya. Direndam selama 5 hari ditempatkan pada ruang yang terlindung dari paparan sinar matahari langsung dan sesekali diaduk. Setelah 5 hari filtrat disaring, ampas diperas. Proses maserasi diulangi sampai 3 kali. Ekstrak yang diperoleh didiaamkan selama 2 hari kemudian diuapkan dengan *rotary evaporator*. Ekstrak kental dikeringkan menggunakan *waterbath* hingga diperoleh ekstrak kering.

Skrining Fitokimia Alkaloid Ekstrak 3 ml + 5 ml HCl 1% lalu dilakukan pemanasan dalam waktu 20 menit. Apabila sudah dingin, maka akan dilakukan penyaringan . 1 ml filtrat + asam pikrat, akan memiliki bentuk larutan keruh maupun endapan

Ekstrak + NH_4OH hingga menjadi basa kemudian + 10 ml (kloroform : air = 1:1) dan dikocok. Lapisan kloroform + 3 tetes Wagner P terbentuk endapan merah coklat

Ekstrak + NH₄OH sampai basa terbentuk lalu + 10 ml (kloroform : air =1:1) dan dikocok. Lapisan kloroform + Mayer P memiliki bentuk endapan putih

Tanin

Ekstrak 1 ml + 3 tetes FeCl₃ memiliki bentuk endapan hijau – biru hitam

Saponin

Ekstrak 1 ml + 10 ml air kemudian dikocok kuat akan terbentuk busa stabil. Tambahkan l tetes HCL 2 N dinyatakan positif apabila buih tidak hilang

Flavonoid

Ekstrak 3 ml + 1 ml NaOH 10% terbentuk warna kuning.

Ekstrak + HCl kemudian + serbuk Mg kocok akan terbentuk warna kuning-jingga-merahungu. Akan ada warna jingga maupun merah yang menggambarkan flavon, flavanol jika terbentuk larutan berwarna merah hingga merah padam, jik terbentuk warna merah padam hingga merah keunguan menggambarkan flavanon.

Glikosida

Ekstrak 1 ml + 10 ml $\rm H_2SO_4$ 50% kemudian dipanaskan selama 15 menit. Selanjutnya + larutan Fehling serta melakukan pemanasan sampai memiliki bentuk endapan merah bata

Steroid

Ekstrak 1 ml + 10 ml H₂SO₄ pekat memiliki bentuk larutan kemerahan

Terpenoid

Ekstrak 1 ml + 3 tetes HCl pekat + 1 tetes H₂SO₄ pekat memiliki bentuk warna ungu atau merah

Antrakuinon

Ekstrak + benzene 10 ml lalu dilakukan penyaringan. Filtrat + 0,5 ml ammonia. Campuran kemudian dilakukan pengocokan dengan kuat, serta akan memiliki bentuk warna ungu pada fase layer

Sterilisasi Alat

Alat-alat gelas yang terdiri dari cawan petri serta tabung reaksi disterilisasi dengan menggunakan oven, suhu 180°C selama 2 jam. Ose dan pinset disterilkan dengan pemijaran menggunakan lampu spiritus.

Penyiapan Media

Pepton Water

Ditimbang 2,55 g pepton water (merck) dilarutkan dengan aquadest sebanyak 100 ml, selanjutnya disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit

Nutrien Agar

Ditimbang serbuk Nutrien Agar (merck) sebanyak 18 dilarutkan dengan 100 ml aquadest, dipanaskan di atas api hingga larut. Disteril menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

Mueller Hinton Agar

Sebanyak 6,8 g serbuk MHA (merck) ditimbang ke 2 udian ditambahkan 200 ml aquadest, dipanaskan hingga larut. Media selanjutnya disterilkan di autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit

Penyiapan Bakteri Uji

Peremajaan Bakteri Uji

Enterococcus faecalis de Citrobacter freundii dari stok murni diinokulasi ke media Pepton Water, diinku 23 i selama 1 x 24 jam dengan suhu 37°C. Selanjutnya diinokulasi ke media miring Nutrien Agar, dimasukkan ke dalam incubator suhu 37°C selama 24 jam.

Penyiapan Suspensi Bakteri

Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii yang sudah diremajakan diambil 1 ose kemudian disuspensikan ke dalam air steril, dikocok sampai homogen, Tingkat kekeruhan yang diperoleh sama dengan McFarland 0,5.

Penyiapan Ekstrak

Ekstrak Daun Pegagan dibuat konsentrasi 2%, 4% dan 8% b/v dengan cara disuspensikan dengan Na CMC 1% yang sudah disterilkan.

Pengujian Potensi Antibakteri

Cawan petri yang sudah steril diisi dengan *Mueller Hinton Agar* (MHA) yang juga sudah disterilkan sebanyak ± 20 ml, dibiarkan memadat. *Paper disc* direndam dengan ekstrak etanol Daun Pegagan 2%, 4%, 8% dan Na. CMC sebagai control negative. Bakteri uji diulas pada permukaan media MHA secara merata menggunakan swab steril, dibiarkan selama ± 15 menit. Diletakkan *paper disc* yang suda z lirendam dengan ekstrak tanaman dan sudah ditiriskan, diatur sedemikian rupa. Dimasukkan ke dalam inkubator pada suhu 37°C selama 24 jam. Diamati dan diukur diameter zona hambat. Replikasi pengujian dilakukan sebanyak 5 kali.

HASIL

Penelitian dimulai dengan pembuatan simplisia kering Daun Pegagan kemudian dilakukan proses ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan etanol 96 5 sebagai cairann penyari. Untuk mengetahui kandungan fitokemikal dilakukan skrining fitokimia (tabel 1).

Tabel I. Hasil Uji Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban

Bahan Uji	Kandungan senyawa kimia									
	Tanin	Flavonoid	Steroid	Terpenoid	Glikosida	Alkaloid	Saponin	Antrakuinon		
Ekstrak Etanol Daun Pegagan	+	+	+	+	-	+	-	1-1		

Pengujian dilanjutkan dengan uji potensi antibakteri terhadap Enterocot a faecalis dan Citrobacter freundii. Kedua bakteri ini terdapat di dalam system pencernaan dan masuk ke dalam tubuh bersama makanan dan minuman yang tercemar dengan bakteri tersebut. Uji potensi dapat ditentukan denga mengukur luas diameter zona hambat (Tabel 2)

Tabel 2. Hasil Pengujian Potensi Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pegagan (*Centella asiatica* (L.) Urban) terhadap Pertumbuhan *Enterococcus faecalis* dan *Citrobacter freundii*

Bakteri Uji	Replikasi	asi Diameter Zona Hambat Pertumbuhan (m				
		2%	4%	8%	Kontrol (-)	
Enterococcus faecalis	1	10,10	12,10	15,50	0,00	
	2	10,00	13,00	16,00	0,00	
	3	7,00	9,00	15,00	0,00	
	4	8,00	10,20	14,00	0,00	
	5	7,10	10,10	15,10	0,00	
	Rerata	8,44	10,88	15,12	0,00	

Citrobacter freundii	1	10,00	12,00	14,10	0,00
	2	10,10	12,10	14,00	0,00
	3	11,00	13,10	18,00	0,00
	4	11,10	13,00	16,00	0,00
	5	9,00	11,00	15,00	0,00
	Rerata	10,24	12,24	15,42	0,00

Tabel 3. Hasil Analisis Mann Whiney Uji Potensi Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) terhadap Pertumbuhan Enterococcus faecalis

Perlakuan	n	Zon	a hambat pe	ertumbuhan bakteri uji		
bahan uji		Mean	Std. dev	Median	Min	Max
EDP 2%	5	8,4400	1,52086	8,0000a	7,00	10,10
EDP 4%	5	10,8600	1,63951	10,2000 a	9,00	13,00
EDP 8%	5	15,1200	0,72959	15,1000	14,00	16,00

Superscript ^a menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar kelompok (berdasarkan uji Mann Whitney dengan nilai p<0,05).

Tabel 4. Hasil Analisis Mann Whiney Uji Potensi Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) terhadap Pertumbuhan Citrobacter freundii

Perlakuan bahan uji	n	Zon	rtumbuhan b	akteri uj	i	
		Mean	Std. dev	Median	Min	Max
EDP 2%	5	10,2400	0,85615	10,1000	9,00	11,10
EDP 4%	5	12,2400	0,85615	12,1000	11,00	13,10
EDP 8%	5	15,4200	1,65289	15,0000	14,00	18,00

PEMBAHASAN

Centella asiatica (L.) merupakan tanaman dengan habitus herba dan tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis (Singh et al., 2010). Di Indonesia, masyarakat mengenal tanaman ini dengan nama pegagan. Pada penelitian ini diguanakan bagian daun dari Pegagan sebagai 13 an uji, hal ini berdasarkan pada penelitian (Ningsih et al., 2020), bahwa berdasarkan habitusnya, tumbuhan yang paling banyak digunakan sebagai obat tradisional adalah herba, sedangkan menurut bagian tanaman yang paling sering digunakan adalah daun. Daun Pegagan memiliki aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli (Sandy et al., 2021), yang merupakan salah satu bakteri yang hidup di saluran pencernaan. Selain itu, bakteri yang terdapat pada saluran pencernaan dasaranya adalah Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii. Sona seperti Escherichia coli, kedua bakteri ini merupakan flora normal saluran pencernaan dan masuk 145 lalam tubuh bersama makanan dan minuman yang sudah tercemar (Pratiwi, 2008). Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan potensi antibakteri ekstrak etanol Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) terhadap Pertumbuhan Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii berdasarkan adanya diameter zona hambat.

Daun Pegitan memiliki tekstur yang lunak sehingga senyawa fitokimianya dapat lekstraksi dengan metode maserasi, dengan menggunakan etanol 96% sebagai cairan penyari. Maserasi merupakan metode ekstraksi secara dingin yang digunakan untuk simplisia yang memiliki tekstur lunak. Pemilihan etanol sebagai cairan penyari karena bersifat universal dan tidak toksik (Depkes RI, 1986).

Pengujian potensi antibakteri dilakukan menggunakan metode disc diffution, dengan konsentrasi ekstrak 2%, 4%, dan 8% yang disuspensikan dengan Na. CMC 1% sehingga digunakan sebagai control negative. Hasil pengamatan ket 24 konsentrasi menunjukkan adanya potensi antibakteri terhadap kedua jenis bakteri yang diuji ya 32 ditandai dengan terbentuknya zona jernih di sekitar paper disc yang menandakan tidak adanya pertumbuhan bakteri di area tersebut. Zona hambat yang terbentuk setelah lebih 24 jam perlahan mengecil dan kemudian ditumbuhi bakteri. Hal ini menandakan bahwa ekstrak etanol Daun Pegagan bersifat sebagai bakteriostatik. Antimikroba dinyatakan hanya bersifat menghambat (bakteriostatik) apabila antibakteri tersebut menunjukkan adanya diameter zona hambat di sekitar area obat tetapi akan semakin mengecil seiring katar obat. Dengan kata lain, suatu antibakteri hanya bersifat bakteriostatik (menghambat) pertumbuhan bakteri jika pemberian senyawa terus dilaku 11 dan bakteri akan tumbuh kembali jika pemberian obat dihentikan atau habis yang dapat diamati dengan berkurangnya diameter zona hambat seiring dengan bertambahnya masa inkubasi. Sebaliknya apabila diameter zona hambat semakin luas pada inkubasi hari berikutnya maka antig kteri tersebut dinyatakan bersifat bakterisida atau memiliki kemampuan membunuh bakteri. Hal ini disebabkan karena senyawa ini mampu membunuh dan menghentikan aktivitas fisiologis dari bakteri, meskipun pemberian senyawa tersebut dihentikan (Mycek, 2001). Pada penelitian ini digunakan 3 konsentrasi yaitu 2%, 4% dan 8% dengan replikasi sebanyak 5 kali sehingga diperoleh hasil yang valid. Berdasarkan hasil statistic Mann Whitney (dengan nilai p<0.05), aktivitas antibakteri ekstrak Daun Pegagan terhadap Enterococcus faecalis pada konsentrasi 2% dan 4% tidak memilika perbedaan yang signifikan tetapi memiliki aktivitas yang berbeda dengan 8%. Aktivitas antibakteri terhadap Citrobacter freundii terdapat perbedaan yang signifikan terhadap ketiga konsentrasi yang digunakan. Konsentrasi yang paling optimal dalam menghambat pertumbuhan Enterococcus faecalis maupun Citrobacter freundii adalah 8 % (tabel 3 dan 4), data dari hasil pengamatan menunjukkan diameter zona hambat terluas adalah 8% (tabel 2). Penelitian ini sejalan dengan pengujian antibakteri yang dilakukan oleh (Setiawan, Fatriadi and Prisinda, 2023) dengan menggunakan ekstrak etanol Daun Kemangi terhadap Enterococcus faecalis dengan konsentrasi yang lebih tinggi menghasilkan diameter zona hambat yang hampir sama dengan ekstrak Daun Pegagan. Begitu pula dengan aktivitas antibakteri terhadap Citrobacter 22 ndii yang dilakukan oleh (Buyun, 2019) menggunakan Ekstrak Daun Begonia memperlihatkan diameter zona hambat yang lebih luas dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Ketiga ekstrak ini memiliki kesamaan kandungan fitokemikal yaitu flavonoid.

Ekstrak Daun Pegagan memiliki potensi antibakteri terhadap Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii karena mengandung senyawa fitokimia yaitu tannin, flavonoid, steroid, terpenoid dan alkaloid (tabel 1). Tannin dapat mendenaturasi protein sel bakteri , melakukan penghambatan penghambatan penghambatan penghambatan penghambatan pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat sintesis asam nukleat. Flavonoid memiliki kemampuan untuk pembentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler kemudian larut dan 34 njutnya akan membentuk kompleks dengan dinding sel bakteri dan menyebabkan terjadinya kerusakan pada dinding sel bakteri sehingga senyawa intraselular akan keluar. Flavonoid juga dapat menghambat pembentukan DNA dan RNA dengan cara menumpuk asam basa nukleat pada proses pengikatan hydrogen penyawa ini juga dapat mengganggu aktivitas antibakteri dan protein ekstraselular dengan cara mencegah pembentukan energi pada membrane sitoplasma dan menghambat motilitas bakteri. Steroid memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan membrane fosfolipid sehingga dapat menyebabkan menurunnya integritas membrane sel terganggunya morfologi sel sehingga mengakibatkan lisisnya sel. Terpenoid memiliki kemampuan untuk berikatan

dengan protein transmerg rane yang disebut porin, ikatan polimer ini sangat kuat sehingga menyebabkan kerusakan porin yang merupakan tempat keluar masuknya senyawa. Kerusakan ini akan menyebabkan berkurangnya permeabilitas dinding sel dan berakibat terhadap berkurangnya nutrisi dan akhirnya menyebabkan terhambatnya pertumbuhan bakteri. Pen hambatan pertumbuhan bakteri oleh alkaloid adalah mengganggu pembentukan dinding sel dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan, sehingga dapat menyebabkan kematian sel (Cowan, 1999).

Berdasarkan data yang diperoleh, ekstrak etanol Daun Pegagan memiliki potensi sebagai antibakteri terhadap *Enterococcus faecalis* dan *Citrobacter freundii*. Hasil ini menambah data ilmiah mengenai efek farmakologik khususnya antibakteri dari tanaman ini.

KESIMI3 LAN

Ekstrak etanol Daun Pegagan (*Centella asiatica* (L.) Urban) memiliki potensi antibakteri terhadap *Enterococcus faecalis* dan *Citrobacter freundii*.

SARAN

Sebaiknya dilakukan pengujian kadar kandungan total kandungan senyawa dari ekstrak untuk mendukung aktivitas antibakteri tanaman tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Bai, L. et al. (2012) 'Isolation and characterization of cytotoxic, aggregative citrobacter freundii', PLoS ONE, 7(3). doi: 10.1371/journal.pone.0033054.
- Balitbang (2011) 'Balai Besar Litbang. 2011. Pedoman Umum Panen dan Pascapanen Tanaman Obat. Kemenkes RI', Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), pp. 1689–1699.
- Bernardi, S. et al. (2021) 'Subinhibitory antibiotic concentrations enhance biofilm formation of clinical enterococcus faecalis isolates', Antibiotics, 10(7). doi: 10.3390/antibiotics10070874.
- Buyun, L. (2019) 'Screening for Antimicrobial Activity of Nine Ethanolic Extracts Obtained from Leaves of Begonia Plant: a Possible Alternative in the Treatment of Infections Caused by Citrobacter Freundii', pp. 312–322. doi: 10.15414/agrobiodiversity.2019.2585-8246.312-322
- Cowan, M. M. (1999) 'Plant Products as Antimicrobial Agents', Clinical Microbiology Reviewes, 12.
- Depkes RI (1986) Sediaan Galenik. Jakarta: Dirjen POM.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (2015) 'Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan'.
- Golob, M. et al. (2019) 'Antimicrobial Resistance and Virulence Genes in Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis from Humans and Retail Red Meat', BioMed Research International, 2019, pp. 14–16. doi: 10.1155/2019/2815279.
- Liu, Liyun et al. (2018) 'Genetic diversity, multidrug resistance, and virulence of citrobacter freundii from diarrheal patients and healthy individuals', Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 8(JUL), pp. 1–10. doi: 10.3389/fcimb.2018.00233.
- Mende, P. S., Pelealu, J. and Kolondam, B. (2019) 'Identifikasi Molekuler Bakteri Dalam Feses Kucing (Felis Domestica) Yang Ditumbuhkan Pada De Mann Rogosa Sharpe Agar (Mrsa) Molecular Identification Of Bacteria In Cat (Felis domestica) Feces Grown On De Mann Rogosa Sharpe Agar', 8, Pp. 73–78.

- Mycek, M. (2001) Farmakologi ; Ulasan Bergambar. 2nd edn. Jakarta: Widya Medika.
- Ningsih, K. et al. (2020) 'Studi Pemanfaatan Tumbuhan Obat Berpotensi Mengobati Pada Penyakit Pada Penyakit Sistem Pencernaan Di Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau', *Jurnal Hutan Lestari*, 8(2), pp. 217–228. doi: 10.26418/jhl.v8i2.39782.
- Pratiwi, S. T. (2008) Mikrobiologi Farmasi. Yogyakarta: Erlangga.
- Sandy, M. *et al.* (2021) 'Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak , Fraksi n -Heksan , Faksi Etil Asetat , Fraksi Air Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urb) Terhadap Escherichia coli ATCC 25922', *Media Farmasi Indonesia*, 16(2), pp. 1683–1692.
- Setiawan, A. S., Fatriadi, F. and Prisinda, D. (2020) 'Aktivitas Antibakteri Fraksi Etanol Daun Kemangi (Ocimum americanum) Terhadap Enterococcus faecalis ATCC 29212', ODONTO: Dental Journal, 7(2), p. 111. doi: 10.30659/odj.7.2.111-116.
- Singh, S. et al. (2010) 'Centella asiatica (L.): A plant with immense medicinal potential but threatened', International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 4(2), pp. 9–17.
- Soepomo, P. (2013) 'Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Saluran Pencernaan Menggunakan Metode Dempster Shafer', *JSTIE (Jurnal Sarjana Teknik Informatika) (E-Journal)*, 1(1), pp. 32–41. doi: 10.12928/jstie.v1i1.2502.

ORIGINALITY REPORT

24_% SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

15% PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

journal.poltekkes-mks.ac.id

3%

2 123dok.com

2%

etd.repository.ugm.ac.id

2%

docobook.com

1 %

core.ac.uk

1 %

Fadhillah Azzahra, Maulida Hayati. "UJI
AKTIVITAS EKSTRAK DAUN PEGAGAN (Centella
asiatica (L). Urb) TERHADAP PERTUMBUHAN
Streptococcus mutans", B-Dent, Jurnal
Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah,
2019

1 %

Publication

7

ojs.unud.ac.id

Internet Source

1 %

8	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1 %
9	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
10	www.scribd.com Internet Source	1 %
11	jurnal.untan.ac.id Internet Source	1 %
12	jurnal.untad.ac.id Internet Source	1 %
13	idoc.pub Internet Source	1 %
14	adoc.pub Internet Source	<1%
15	e-journal.unipma.ac.id Internet Source	<1%
16	jurnal.fkmumi.ac.id Internet Source	<1%
17	Naniek Suhartatik, Akhmad Mustofa, Beti C Astuti, Eko Yuliastuti E.S., Iklima Mufadilah. "Pemanfaatan Beberapa Varietas Jeruk Sebagai Antimikroba Alami pada Saus Kacang Cilok", AGRITEKNO: Jurnal Teknologi Pertanian, 2022	<1%

18	khomarudinhendrik.blogspot.com Internet Source	<1%
19	ojs.stikes-muhammadiyahku.ac.id Internet Source	<1%
20	RIDHO ASRA, Nize Ria Azni, Rusdi Rusdi, Nessa Nessa. "Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Fraksi Heksan, Fraksi Etil Asetat dan Fraksi Air Daun Kapulaga (Elettaria cardamomum (L.) Maton)", Journal of Pharmaceutical And Sciences, 2019 Publication	<1%
21	ahmalhanif.blogspot.com Internet Source	<1%
22	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
23	jurnal.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1%
24	ojs.uho.ac.id Internet Source	<1%
25	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
26	Firdy Liwang. "UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI JAMUR ENDOFIT AKAR BAKAU Avicennia marina TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus dan Escherichia coli", Jurnal e- Biomedik, 2014	<1%

27	id.scribd.com Internet Source	<1%
28	medpub.litbang.pertanian.go.id Internet Source	<1%
29	repository.nwu.ac.za Internet Source	<1%
30	repository.unmuha.ac.id:8080 Internet Source	<1%
31	zombiedoc.com Internet Source	<1%
32	Florencia I. Mahmud, Christi Mambo, Henoch Awaloei. "Uji daya hambat ekstrak daun patikan kerbau (euphorbia hirta I.) terhadap pertumbuhan bakteri staphylococcus aureus dan escherichia coli", Jurnal e-Biomedik, 2016 Publication	<1%
33	Anastasia P.R. Nurhamidin, Fatimawali Fatimawali, Irma Antasionasti. "UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK N-HEKSAN BIJI BUAH LANGSAT (Lansium domesticum Corr) TERHADAP BAKTERI Staphylococus Aureus DAN Klebsiella Pneumoniae", PHARMACON, 2021	<1%

Aprillia Dini Sulistyanti, Emma Kamelia, Hadiyat Miko, Tritania Ambarwati, Rena Setiana. "MENGUNYAH BUAH APEL ROYAL GALA TERHADAP PEMBENTUKAN PLAK DAN DERAJAT KEASAMAN SALIVA PADA SISWA KELAS VI SDIT ASSUNNAH KOTA CIREBON", JDHT Journal of Dental Hygiene and Therapy, 2021

<1%

Publication

Glorya Sakul, Herny E. I. Simbala, Gerald Rundengan. "UJI DAYA HAMBAT EKSTRAK ETANOL DAUN PANGI (Pangium edule Reinw. ex Blume) TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus, Escherichia coli DAN Pseudomonas aeruginosa", PHARMACON, 2020

<1%

Publication

Siska Nuryanti. "AKTIVITAS ANTIFUNGI SARI DAUN PEPAYA (Carica papaya L.) TERHADAP Candida albicans", Jurnal Ilmiah As-Syifaa, 2017

<1%

Publication

eprints.uns.ac.id

<1%

Exclude quotes On Exclude matches Off