

**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH NASIONAL**

Judul Karya Ilmiah (Artikel)	Formulasi Dan Stabilitas Mutu Fisik Sediaan Gel Wajah Yang Mengandung Ekstrak Daun Afrika Dengan Variasi Konsentrasi Carbopol		
Nama Penulis	: Dwi Rachmawaty, Arisanty , St Mutmainnah Dewi Reski, Alfrida Monica Salasa, St Ratnah		
Jumlah Penulis	: 5 orang		
Status Pengusul	: Penulis pertama (Koresponden)		
Identitas Jurnal/Artikel	a. Nama Jurnal	Media Farmasi	
	b. Nomor ISSN	p.issn 0216-2083 e.issn 2622-0962	
	c. Volume, Nomor, Bulan, Tahun	Vol. 18 No.1, April 2022	
	d. Penerbit	Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Makassar	
	e. DOI artikel (kalau ada)	https://doi.org/10.32382/mf.v17i2.2299	
	f. Alamat web jurnal	https://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediafarmasi/article/view/139 https://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediafarmasi/article/view/2299/1580	
	g. Terindeks di	: https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/4825 sinta 5	
Kategori publikasi Jurnal Ilmiah (beri √ pada kategori yang tepat)	<input type="checkbox"/> Jurnal Nasional Terakreditasi (peringkat 1 dan 2) <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional Bahasa Inggris (peringkat 3 dan 4) <input checked="" type="checkbox"/> Nasional Bahasa Indonesia (peringkat 5 dan 6) <input type="checkbox"/> Nasional di luar peringkat		

Hasil penilaian *Peer Review*

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				
	Nasional terakreditasi Peringkat (1 dan 2)	Nasional Bahasa Inggris Peringkat (3 dan 4)	Nasional Bahasa Indonesia Peringkat (5 dan 6)	Nasional di luar Peringkat	Nilai Akhir yang diperoleh
	Nilai maks 25	Nilai maks 20	Nilai maks 15	Nilai maks 10	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal ilmiah (10%)			1,5		1,2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			4,5		4,4
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)			4,5		4,2
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)			4,5		4,3
Total = (100%)			15		14,1
Nilai pengusul = 60 % x 14,1 = 8,46					

Catatan Peer Reviewer :

1. Tentang Kelengkapan Unsur isi

Sistematika penulisan artikel sudah memenuhi kelengkapan unsur isi, abstrak menggunakan bahasa Indonesia yang baik, terdapat kesinambungan antara pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan .

2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan

Ruang lingkup penulisan sudah seuai dengan sistematika penulis, kedalaman Pembahasan sudah baik dengan mengambil dari beberapa rujukan jurnal terupdate.

3. Kecukupan dan Kemutakhiran data / informasi dan metodologi

Kecukupan dan kemutakhiran data yang digunakan sudah baik, metode penelitian sudah sesuai, topik penelitian dan sumber data yang digunakan mutahir dengan rujukan dominan pustaka primer.

4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan

Kualitas jurnal baik dan lengkap, terbitan jurnal continue dan penerbit artikel ini adalah Jurnal Media Farmasi yang telah terakreditasi SINTO 5

5. Indikasi Plagiasi

Tidak terdapat indikasi plagiasi, hasil pengacitan aplikasi turnitin 13 % .

6. Kesesuaian bidang ilmu

Sesuai bidang ilmu peneliti yaitu Farmasi .

Makassar , 15 September 2022

Reviewer 1

Nama	:	Dr. Rusli, Sp.FRS., Apt
NIP	:	19670506 199703 1 002
Unit Kerja	:	Poltekkes Kemenkes Makassar
Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
Bidang Ilmu	:	Farmasi

**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH NASIONAL**

Judul Karya Ilmiah (Artikel)	Formulasi Dan Stabilitas Mutu Fisik Sediaan Gel Wajah Yang Mengandung Ekstrak Daun Afrika Dengan Variasi Konsentrasi Carbopol		
Nama Penulis	: Dwi Rachmawaty, Arisanty , St Mutmainnah Dewi Reski, Alfrida Monica Salasa, St Ratnah		
Jumlah Penulis	: 5 orang		
Status Pengusul	: Penulis pertama (Koresponden)		
Identitas Jurnal/Artikel	a. Nama Jurnal	Media Farmasi	
	b. Nomor ISSN	p.issn 0216-2083 e.issn 2622-0962	
	c. Volume, Nomor, Bulan, Tahun	Vol. 18 No.1, April 2022	
	d. Penerbit	Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Makassar	
	e. DOI artikel (kalau ada)	https://doi.org/10.32382/mf.v17i2.2299	
	f. Alamat web jurnal	https://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediafarmasi/article/view/139 https://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediafarmasi/article/view/2299/1580	
	g. Terindeks di	: https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/4825 sinta 5	
Kategori publikasi Jurnal Ilmiah (beri √ pada kategori yang tepat)	<input type="checkbox"/> Jurnal Nasional Terakreditasi (peringkat 1 dan 2) <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional Bahasa Inggris (peringkat 3 dan 4) <input checked="" type="checkbox"/> Nasional Bahasa Indonesia (peringkat 5 dan 6) <input type="checkbox"/> Nasional di luar peringkat		

Hasil penilaian *Peer Review*

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				
	Nasional terakreditasi Peringkat (1 dan 2)	Nasional Bahasa Inggris Peringkat (3 dan 4)	Nasional Bahasa Indonesia Peringkat (5 dan 6)	Nasional di luar Peringkat	Nilai Akhir yang diperoleh
	Nilai maks 25	Nilai maks 20	Nilai maks 15	Nilai maks 10	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal ilmiah (10%)			1,5		1,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			4,5		4,5
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)			4,5		4,2
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)			4,5		4,1
Total = (100%)			15		14,3
Nilai Pengusul = 60% x 14,3 = 8,58					

Catatan Peer Reviewer :

1. Tentang Kelengkapan Unsur isi

Unsur lengkap dan ada benang merah antara pendahuluan, metode, hasil, pembahasan dan kesimpulan

2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan

Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan baik dan mengambil dari beberapa rujukan jurnal terupdate.

3. Kecukupan dan Kemutakhiran data / informasi dan metodologi

Metode penelitian sudah sesuai, topik penelitian dan sumber data yang digunakan mutakhir dengan rujukan dominan pustaka primer

4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan

Kualitas jurnal baik dan lengkap, terbitan jurnal kontinu dan terakreditasi Sinta 5.

5. Indikasi Plagiasi

Hasil pengecekan aplikasi turnitin 13 %

6. Kesesuaian bidang ilmu

Sesuai dengan bidang ilmu peneliti

Makassar, 15 September 2022

Reviewer 2

Nama	:	Dr. Sesilia Rante Pakadang, M.Si., Apt
NIP	:	196909222000122001
Unit Kerja	:	Poltekkes Kemenkes Makassar
Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
Bidang Ilmu	:	Farmasi

SERTIFIKAT

Direktorat Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Kutipan dari Keputusan Direktur Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor: 28/E/KPT/2019

Tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 5 Tahun 2019

Media Farmasi

E-ISSN: 26220962

Penerbit: Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Makassar

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 5

Akreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun, yaitu

Volume 14 Nomor 1 Tahun 2018 sampai Volume 18 Nomor 1 Tahun 2022

Jakarta, 26 September 2019

Direktur Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan



Dr. Muhammad Dimyati
NIP. 195912171984021001



TERAKREDITASI



MEDIA FARMASI

Diterbitkan Oleh :
Jurusan Farmasi
Poltekkes Kemenkes Makassar
Volume 18 No 2, April 2022

MEDIA FARMASI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MAKASSAR

Penasehat : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar
Penanggung Jawab : Ketua Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan
Kemenkes Makassar

Dewan Redaksi
Manajer : Santi Sinala, M.Si.,Apt
Editor : Hendra Stevani, M.Kes.,Apt.
Dr.Sisilia Rosmala Dewi M.Kes.,Apt.
Muli Sukmawati, S.Farm.,Apt.
Hesty Setiawati, S.Farm.,M.Si.
Risna, S.Farm.,M.Si,Apt.
Hijrawaty Ayu Wardhani, S.Farm.,M.Si.

Alamat Redaksi : Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Makassar
Jl. Baji Gau No.10 Makassar
Telp. 0411-854021, 830883 Fax. 0411-830883
e-mail : mediafarmasi@poltekkes-mks.ac.id
website <http://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediafarmasi/>
Kode pos 90134

EDITORIAL

Pembaca yang budiman, ucapan syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya walaupun masih dalam masa wabah Covid 19 ini kami masih mampu menerbitkan Media Farmasi Vol. 18 No 1, April 2022, Media Farmasi telah mendapat legalitas sebagai media resmi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan nomor penerbitan **ISSN P. ISSN No. 0216-2083 E-ISSN 2622-0962** dan telah terakreditasi SINTA Ristekdikti dan sementara dalam pengurusan indeksasi oleh DOAJ

Media Farmasi Politeknik Kesehatan Makassar merupakan suatu wadah dalam menampung aspirasi ilmiah terutama dalam bidang kefarmasian, baik Farmasi Komunitas, Farmasi Klinik, Maupun Farmasi Sains, dari teman-teman seminat Ilmu Farmasi di seluruh Indonesia.

Media Farmasi Politeknik Kesehatan Makassar berinisiatif untuk menambah jangkaun publikasi kami, salah satu caranya dengan memberikan setiap artikel abstrak berbahasa inggris yang telah di proofreading dengan baik oleh pihak yang kompeten

Akhirnya redaksi sangat berharap bahwa semua artikel yang disajikan dalam edisi ini dapat memberi apresiasi keilmuan di bidang kesehatan bagi kita semua. Oleh karena itu kritikan dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan edisi-edisi selanjutnya.

Selamat membaca

Makassar , April 2022

Redaksi

DAFTAR ISI

<u>Efek Proteksi Madu Trigona Sp Pada Tikus Putih (<i>Rattus norvegicus</i>) yang Diinduksi Atorvastatin Dengan Parameter Histopatologi Hati</u> Mirnawati Salampe, Mutiara Mutiara, Sukamto S Mamada	1-9
<u>Efektifitas Penyembuhan Luka Sayat Spray Gel Minyak Nilam Pada Kelinci (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)</u> Junvidya Heroweti, M Fatchur Rochman, Danang Novianto Wibowo, Isnina Rokhmatun Khasanah, Safira Salma	10-15
<u>Suhu Dan Waktu Optimum Penyeduhan Simplisia Bunga Telang (<i>Clitoria ternatea L</i>) Terhadap Kandungan Antioksidan</u> Luluk - Anisyah, Ida Ayu Preharsini Kusuma, Lela Veronika Tindaon	16-19
<u>Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Semangka (<i>Citrullus lanatus Linn</i>) Dalam Sediaan Sirup Sebagai Imunostimulan</u> Ermawati Ermawati, Ananda Ramadani	20-24
<u>Aktivitas Antioksidan Kombinasi Seduhan Buas-Buas (<i>Premna serratifolia Linn.</i>), Meniran (<i>Phyllanthus niruri L.</i>), Secang (<i>Caesalpinia sappan Linn.</i>) Dan Rosela (<i>Hibiscus sabdarifa</i>) dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil)</u> isnendar . isnendar, Sri Luliana	25-29
<u>Gambaran Penggunaan Fibrinolitik Pada Pasien Stemi (St-Segment Elevation Myocardial Infarction) Di Rumah Sakit “X” Di Kota Tarakan</u> Marizka Anggreani, Irma Novrianti, Sari Wijayanti	30-35
<u>Hubungan Usia, Pendidikan, dan Lama Bekerja dengan Pengetahuan Tenaga Kesehatan tentang Inkompatibilitas Sediaan Intravena</u> Rizta Widya Pangestika	36-41
<u>Formulasi Dan Stabilitas Mutu Fisik Sediaan Gel Wajah Yang Mengandung Ekstrak Daun Afrika Dengan Variasi Konsentrasi Carbopol</u> Dwi Rachmawaty Daswi, Arisanty Arisanty, St Mutmainnah Dewi Reski, Alfrida Monica Salasa, St Ratnah	42-48
<u>Evaluasi Penggunaan Obat Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya Kota Makassar</u> Raimundus Chalik, Hidayati Hidayati, La Sakka, Haryuni Haryuni	49-59
<u>Perbandingan Karakteristik Potensi Antibakteri Ekstrak Daun Dan Bunga Kemangi (<i>Ocimum sanctum L</i>) Terhadap <i>Propionibacterium acnes</i></u> Sesilia Rante Pakadang, Muhammad Anugerah Alam Waris, Kiki Arnalia Sari, Djuniasti Karim	60-66
<u>Potensi Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pegagan (<i>Centella asiatica (L.) Urban</i>) Terhadap Pertumbuhan <i>Enterococcus faecalis</i> dan <i>Citrobacter freundii</i></u> St. Ratnah, Alfrida Monica Salasa, Dwi Rachmawaty Daswi, Arisanty Arisanty	67-73

<u>Perbandingan Kadar Flavonoid Simplisia Buah Pare (<i>Momordica charantia L.</i>) Pada Temperatur 60°C, 80°C Dan 100°C Dengan Memakai Spektrofotometri Uv-Vis</u> Sugiyanto Sugiyanto, Luluk - Anisyah	74-77
<u>Formulasi Dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Masker Gel Ekstrak Daun Jeruk Purut (<i>Citrus hystrix D.C.</i>)</u> Nurhayana Nurhayana, Hendra Stevani, Hesty Setiawati, Ratna Sari Dewi	78-84
<u>Formulasi Pasta Gigi Berbahan Aktif Herbal Kombinasi Ekstrak Daun Sirih Merah (<i>Piper crocatum Ruiz & Pav.</i>) Dan Ekstrak Daun Mint (<i>Mentha piperita</i>) Sebagai Anti Mikroba Pada Gigi Dan Mulut</u> Jumain Jumain, Syamsuddin Abubakar, Asmawati Asmawati	85-90
<u>Perbandingan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanol Daun Ungu (<i>Graptophyllum pictum l. Griff</i>) Berdasarkan Perbedaan Metode Pengeringan</u> Dyah Ratna Ayu Puspita Sari, Putu Ayu Ratih Listiani, Putu Ayu Ratih Listiani	91-96
<u>Efek Kombinasi Ekstrak Daun Kumis Kucing (<i>Orthosipon aristatus</i>) Dan Daun Sirsak (<i>Annona muricata L.</i>) Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Mencit (<i>Mus musculus</i>)</u> Irenewati Somalangi, Sisilia Rosmala Dewi, Santi Sinala	97-103
<u>Effect Of Extract Breadfruit Leaf (<i>Artocarpus altilis (Park.) Fosberg</i>) Toward Tumor Necrosis Factor (TNF- α) In Obese Rat (<i>Rattus norvegicus</i>) With Insulin Resistance</u> Wahyudin Wahyudin, Hasanuddin Nuru, Hendra Stevani, Salmah Arafah	104-108



Media Farmasi

Jurusan Farmasi

Poltekkes Kemenkes Makassar

Jl Baji Gau No 10 Makassar, 90134

Telp 0411 854021



FORMULASI DAN STABILITAS MUTU FISIK SEDIAAN GEL WAJAH YANG MENGANDUNG EKSTRAK DAUN AFRIKA DENGAN VARIASI KONSENTRASI CARBOPOL

*Formulation And Physical Quality Stability Of Facial Gel Preparations Containing African Leaf Extract (*Vernonia amygdalina* dell.) With Variations In Carbopol Concentration*

Dwi Rachmawaty Daswi*, Arisanty, St Mutmainnah Dewi Reski, Alfrida Monica, St. Ratnah
Politeknik Kesehatan Makassar

*E-mail korespondensi: dwialamsyah@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.32382/mf.v17i2.2299>

Date submitted 2021-08-3 , Accept Submission 2021-11-17

ABSTRACT

African leaves (*Vernonia amygdalina* Del.) are plants that have benefits as natural antioxidants because it contain phenolic compounds including flavonoids that can ward off free radicals. This study aims to formulate facial gel preparations from African leaf extracts to determine the stability of the physical quality of the preparations. African leaves are extracted using the maceration method and then formulated into a facial gel made in three variations of the formula. Three gel formulas made with different carbopol concentrations are 0.5%, 1%, 2%. Physical quality testing of facial gel preparations is performed before and after the accelerated stability test (freeze thaw), including organoleptics, homogeneity tests, syneresis tests, pH tests, scatterpower tests and viscosity tests. Based on the results, formula II with 1 % carbopol concentration fulfilled almost all the requirement of the physical quality test carried out before and after the accelerated stability test except for pH testing, for formula I with 0.5 % carbopol concentration and formula III with 2 % carbopol concentration only met homogeneity, syneresis and viscosity test requirement. The result of statistical test showed the result of $P>0,05$ which means there is no significant difference from the test results before and after accelerated storage.

Keywords : Physical quality test, facial gel, African leaf extract, carbopol

ABSTRAK

Daun Afrika (*Vernonia amygdalina* Del.) merupakan tanaman yang memiliki manfaat sebagai antioksidan alami karena memiliki kandungan senyawa fenolik termasuk flavonoid yang dapat menangkal radikal bebas. Memformulasikan sediaan gel wajah dari ekstrak daun afrika dan untuk mengetahui kestabilan mutu fisik sediaan merupakan tujuan dari penelitian ini. Daun Afrika diekstraksi dengan menggunakan metode maserasi kemudian di formulasikan kedalam gel wajah yang dibuat dalam 3 variasi formula. Tiga formula gel yang dibuat dengan konsentrasi carbopol yang berbeda yaitu 0,5%, 1%, 2%. Pengujian mutu fisik sediaan gel wajah dilakukan sebelum dan setelah uji stabilitas dipercepat (*freeze thaw*), meliputi organoleptik, uji homogenitas, uji sineresis, uji pH, uji daya sebar serta uji viskositas. Berdasarkan hasil yang diperoleh formula II dengan konsentrasi carbopol 1% memenuhi hampir semua persyaratan uji mutu fisik yang dilakukan sebelum dan sesudah uji stabilitas dipercepat kecuali pengujian PH , untuk formula I dengan konsentrasi carbopol 0,5 % dan formula III dengan konsentrasi carbopol 2% hanya memenuhi persyaratan uji homogenitas, sineresis dan viskositas. Hasil uji statistik menunjukkan hasil $P> 0,05$ yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan dari hasil pengujian sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat.

Kata Kunci: Uji mutu fisik, gel wajah, ekstrak daun Afrika, carbopol

PENDAHULUAN

Obat tradisional merupakan bahan ataupun racikan bahan yang berbentuk bahan tanaman, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) ataupun kombinasi tersebut. Buat penyembuhan serta bisa diterapkan cocok dengan norma yang berlaku di masyarakat ([Puspitasari et al., 2018](#)). Salah satu tumbuhan

yang kerap dimanfaatkan selaku obat yaitu Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*). Di Indonesia secara empiris bagian daun tumbuhan digunakan selaku obat antidiabetes, obat antimalaria serta obat antikanker. Bersumber pada skrining fitokimia yang dicoba di Uganda didapatkan hasil kalau Daun Afrika positif memiliki alkaloid, saponin, tannin, seskueterpen lakton,

triterpenoid, asam amino, flavonoid, terpenoid, serta kardiotonik ([Prabowo et al., 2017](#)).

Daun Afrika umumnya dikenal dengan daunnya yang pahit, merupakan semak yang tumbuh hingga 3 meter di daerah tropis Afrika dan bagian lain Afrika, khususnya, Nigeria, Kamerun dan Zimbabwe yang terkenal memiliki beberapa manfaat kesehatan seperti efek sitotoksik terhadap sel karsinoma nasofaring manusia. Selain itu, Daun Afrika juga efektif melawan disentri amuba, gangguan pencernaan, dan memiliki aktivitas antimikroba dan antiparasit ([Farombi & Owoeye, 2011](#)).

Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) dikenal pula memiliki dampak analgetik. Sebagian saponin berguna sebagai antimikroba. Tannin sudah lama dikenal berguna sebagai adstringen gen sehingga bisa mempersempit luas cedera, adapun steroid serta flavonoid memiliki dampak antiinflamasi, sehingga luka bakar dikurangi keparahannya serta dipulihkan ([Ajayi et al., 2016](#)).

Beberapa penelitian yang lain pula menyatakan terdapatnya isi senyawa fenolik termasuk flavonoid berperan selaku senyawa antioksidan yang bisa mencegah radikal bebas yang ada dalam Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*), ekstrak metanol Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) memiliki nilai IC 50 sebesar 175, 021 ppm serta nilai tabir surya sebesar 50- 250 ppm ([Prabowo et al., 2017](#)). Salah satu aspek yang bisa menimbulkan penuaan pada wajah merupakan radikal bebas, sehingga dibutuhkan bahan ataupun senyawa yang bisa mencegah radikal bebas ini mengurangi proses penuaan pada wajah. Salah satu penangkal dampak kurang baik dari radikal bebasialah senyawa antioksidan ([Mulyawan & Suriani, 2013](#)). Meski Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) mempunyai antioksidan serta tabir surya yang lumayan besar tetapi masih sangat sedikit di manfaatkan oleh warga masyarakat buat kesehatan kulit wajah bisa jadi diakibatkan sebab penggunaannya yang kurang instan oleh sebab itu riset ini memformulasikan daun Afrika dalam sediaan gel wajah dengan konsentrasi carbopol yang bervariasi, diharapkan sediaan gel wajah Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) ini nantinya bisa di manfaatkan secara luas oleh warga masyarakat.

Dalam pembuatan sediaan cair semi solid di butuhkan *gelling agent*, carbopol ialah salah satu *gelling agent* yang biasa dipakai dalam pembuatan sediaan cair semi solid. Inert merupakan sifat carbopol, nyaman, tidak reaktif dengan komponen resep gel yang lain. Carbopol

mempunyai watak hidroskopik, bisa meresap kelembaban air serta udara. Carbopol ialah kelompok asam karboksilat 56%- 68% yang dihitung dari basis kering. Pada formulasi sediaan liquid atau semi solid biasanya menggunakan carbopol selaku suspending atau sebagai agen buat tingkatkan viskositas. Carbopol berperan selaku *gelling agent* pada konsentrasi 0, 5%- 2% ([Rowe, 2006](#)).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti bertujuan untuk memformulasikan sediaan gel wajah yang mengandung ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) serta mengetahui stabilitas mutu fisik dari sediaan gel wajah yang mengandung ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*).

METODE PENELITIAN

Riset ini ialah eksperimen laboratorium dengan membuat sediaan gel wajah serta memastikan kualitas fisik dan kestabilan sediaan gel wajah ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*). Penelitian ini menggunakan alat-alat antara lain, *beaker glass*, batang pengaduk, timbangan Analitik, sendok pengaduk (*stainless steel*), oven, *waterbath*, *mixer* serta alat-alat gelas yang lain buat analisis, *rotary evaporator*, viskometer dan lumpang serta alu. Bahan yang digunakan yakni: metil paraben, propilparaben, etanol 96%, carbopol, trietinolamin (TEA), propilenglikol, dan aquadest.

Prosedur Kerja

Pengolahan Bahan Uji

Sortasi basah dilakukan setelah Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) dikumpulkan, air mengalir digunakan untuk mencuci sampel. Sampel kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan setelah terlebih dahulu di potong-potong kecil sesuai derajat halus daun 5/8.

Pembuatan ekstrak

Bejana maserasi disiapkan, sampel terlebih dahulu ditimbang seberat 100 gram kemudian dimasukkan ke dalam bejana maserasi. Untuk merendam simplisia secara sempurna digunakan aethanol 96%. Ditutup bejana maserasi, dibiarkan selama 5 hari jangan lupa pengadukan dilakukan sesekali, bejana maserasi disimpan terlindung dari cahaya matahari. Maserat dikeluarkan setelah 5 hari, diulangi lagi hal tersebut di atas sebanyak 2-3 kali hingga sampel terekstraksi sempurna. Ekstrak kental diperoleh dengan menguapkan maserat di atas tangas air.

Pembuatan sediaan gel

Tabel 1. Rancangan Formula sediaan gel wajah ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) dengan basis carbopol.

Nama Zat	Konsentrasi (%)			Referensi
	F1	F2	F3	
Ekstrak Daun Afrika	20	20	20	10%-20% ¹
Carbopol	0,5	1	2	05%-2% ²
Trietanolamin	2	2	2	2%-4% ²
Propilenglikol	10	10	10	10%-15% ²
Metil paraben	0,18	0,18	0,18	0,02%-0,3% ²
Aquades	Ad	Ad	Ad	
	100	100	100	

Keterangan:

1. [Puspitasari, 2018](#)
2. [Rowe, 2006](#)

Pembuatan Formula

Pada riset ini menggunakan 3 variasi konsentrasi carbopol. Methyl paraben dan aqua destillata dipanaskan pada suhu 70°C, aduk hingga methyl paraben larut. Carbopol dimasukkan ke dalam campuran methyl paraben aduk hingga terbentuk massa gel. Massa gel yang telah terbentuk didinginkan. Propylenglikol ditambahkan ekstrak Daun Afrika dan trietanolamin aduk hingga homogen, kemudian masukkan campuran ini ke dalam campuran carbopol aduk hingga homogen. Aqua destillata kembali ditambahkan untuk mencukupkan gel hingga 100 gram. Wadah tertutup rapat digunakan untuk menyimpan gel. Evaluasi mutu fisik dilakukan setelah gel disimpan selama 24 jam.

Pengumpulan data

Data primer dari hasil uji mutu fisik sediaan gel wajah ekstrak Daun Afrika meliputi pengujian organoleptis, homogenitas, pH, daya sebar dan uji sineresis menggunakan metode penyimpanan dipercepat dikumpulkan .

Pengolahan Data

Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis data melalui pendekatan teoritis yang membandingkan antara hasil uji mutu fisik sediaan sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat dengan persyaratan yang ditetapkan.

Evaluasi mutu fisik dilakukan sebelum dan sesudah diberi perlakuan *freeze thaw* sebanyak 5 siklus. Evaluasi mutu fisik meliputi :

Uji Organoleptik

Pengamatan terhadap perubahan bentuk, warna dan bau dari sediaan gel wajah ekstrak Daun Afrika dilakukan sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat.

Uji Homogenitas

Bahan-bahan yang digunakan untuk formulasi sediaan gel wajah ini haruslah

terdispersi homogen. Sebanyak 0,1 gram sampel dioleskan pada kaca obyek kemudian diamati apakah bahan-bahan yang terkandung di dalamnya terdispersi merata.

Uji Stabilitas sediaan

Pengukuran pH

Alat pH Meter digunakan untuk mengukur pH pada riset ini. Ketentuan persyaratan pH untuk sediaan topikal adalah 4,5-6,5.

Uji Daya Sebar

Pada riset ini digunakan 2 buah kaca obyek dengan ukuran 20 x 20 cm, sediaan gel wajah seberat 0,5 gram dioleskan pada salah satu kaca obyek sedangkan kaca obyek yang lain digunakan untuk mengcover kaca obyek tersebut. Pemberat 125 gram ditempatkan di atas kaca obyek tersebut diamkan selama 1 menit lalu ukur diameter yang terbentuk. Ketentuan untuk daya sebar ialah 5-7 cm.

Uji Viskositas

Alat viskometer digunakan pada riset ini untuk menentukan viskositas sediaan. Di atas cone berdiameter 5 cm ditempatkan gel, *plate* digunakan untuk menghimpit sediaan gel tersebut hingga tipis namun perlu dijaga agar tidak terjadi pergesekan antara *plate* dan *cone*. Semua formula pada riset ini haruslah mengalami perlakuan yang sama sehingga perlu diatur parameter pengukuran. Penentuan viskositas ini dilakukan setelah sediaan gel di simpan selama 48 jam. Ketentuan yang ditetapkan untuk viskositas gel ialah 2000-4000 cP.

Pengujian Sineresis

Penyimpanan gel pada suhu ±10°C dilakukan untuk mengamati terjadinya sineresis. Air yang dibebaskan dari gel selama penyimpanan ini di tumpang kemudian hitung kehilangan berat yang terjadi dibandingkan

dengan berat awal gel. Tidak terjadinya sineresis selama penyimpanan menunjukkan bahwa

sediaan gel tersebut memenuhi ketentuan sineresis yang ditetapkan..

Hasil Penelitian

Formula

Tabel 2. Formula sediaan gel wajah ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) dengan basis carbopol.

Nama Zat	Bobot (gram)		
	F1	F2	F3
Ekstrak Daun Afrika	6	6	6
Carbopol	0,15	0,3	0,6
Trietanolamin	0,6	0,6	0,6
Propilenglikol	3	3	3
Metil paraben	0,05	0,05	0,05
Aquades ad	30	30	30

Pengamatan Organoleptis

Tabel 3. Hasil pengamatan organoleptis sediaan gel wajah sebelum dan sesudah uji stabilitas dipercepat selama 5 siklus menggunakan *climatic chamber*.

Formula	Organoleptis					
	Sebelum Penyimpanan		Dipercepat		Setelah Penyimpanan	
	konsistensi	Warna	Bau	konsistensi	Warna	Bau
Formula 1	Agak kental	Hijau kecoklatan	Khas	Agak kental	Hijau kecoklatan	Khas
Formula 2	Kental	Hijau kecoklatan	Khas	Kental	Hijau kecoklatan	Khas
Formula 3	Sangat kental	Hijau kecoklatan	Khas	Sangat kental	Hijau kecoklatan	Khas

Pengukuran pH

Tabel 4. Hasil pengamatan pH sediaan gel wajah sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat selama 5 siklus menggunakan *climatic chamber*.

Formula	Sebelum penyimpanan dipercepat	Setelah penyimpanan dipercepat	Persyaratan
Formula 1	7	7	
Formula 2	7	7	4,5 – 6,5
Formula 3	7	7	

Uji Daya Sebar

Tabel 5. Hasil pengukuran daya sebar sediaan gel wajah sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat selama 5 siklus menggunakan alat *climatic chamber*.

Formula	Sebelum penyimpanan dipercepat	Setelah penyimpanan dipercepat	Persyaratan
Formula 1	7	6,5	
Formula 2	5	5	5 – 7
Formula 3	6	4,5	

Uji Homogenitas

Tabel 6. Hasil pengujian homogenitas sediaan gel wajah sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat selama 5 siklus menggunakan alat *climatic chamber*.

Formula	Sebelum penyimpanan dipercepat	Setelah penyimpanan dipercepat	Persyaratan
Formula 1	Homogen	Homogen	Sediaan menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar
Formula 2	Homogen	Homogen	
Formula 3	Homogen	Homogen	

Uji Viskositas

Tabel 7. Hasil pengujian viskositas sediaan gel wajah sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat selama 5 siklus menggunakan alat *climatic chamber*.

Formula	Sebelum penyimpanan dipercepat	Setelah penyimpanan dipercepat	Persyaratan
Formula 1	2028	2375	
Formula 2	3071	3383	2000-4000 cP
Formula 3	3497	3857	

Uji Sineresis

Tabel 8. Hasil pengujian viskositas sediaan gel wajah sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat selama 5 siklus menggunakan alat *climatic chamber*.

Formula	Sebelum penyimpanan dipercepat	Setelah penyimpanan dipercepat	Persyaratan
Formula 1	Tidak terjadi sineresis	Tidak terjadi sineresis	Sineresis terjadi jika keluarnya air
Formula 2	Tidak terjadi sineresis	Tidak terjadi sineresis	dari dalam gel sehingga gel mengkerut
Formula 3	Tidak terjadi sineresis	Tidak terjadi sineresis	

PEMBAHASAN

Pada riset ini diperoleh sediaan gel wajah dengan memakai bahan aktif ekstrak Daun Afrika berdasarkan pada riset sebelumnya oleh ([Prabowo et al., 2017](#)) dimana didapatkan bahwa ekstrak metanol Daun Afrika mempunyai IC 50 sebesar 175, 021 ppm serta angka tabir surya sebesar 50- 250 ppm sehingga ekstrak daun afrika sangat potensial dalam menghambat radikal bebas yang diakibatkan oleh paparan cahaya matahari selaku pemicu penuaan pada wajah ([Prabowo et al., 2017](#)).

Melalui Riset ini dihasilkan sediaan gel wajah dari ekstrak Daun Afrika dengan memvariasikan konsentrasi carbopol 0, 5%, 1% serta 2%. Carbopol dalam resep berfungsi selaku

gelling agent. Carbopol ialah *gelling agent* yang kuat, mempunyai keasaman yang besar sehingga dalam penggunaannya selaku *gelling agent* hanya diperlukan sekitar 0, 5%- 2%.

Sediaan gel wajah dari ekstrak Daun Afrika dicoba pengujian mutu fisik pada keadaan penyimpanan dipercepat pada temperatur 5°C sepanjang 4 jam kemudian pada temperatur 35°C sepanjang 4 jam dengan kelembapan yang tetap sebanyak 5 siklus memakai *climatic chamber*. pengamatan organoleptis, uji homogenitas, uji sineresis, uji pH, uji daya sebar dan uji viskositas merupakan parameter-parameter yang diukur. Sediaan gel wajah ini dinyatakan sesuai syarat mutu fisik yang baik apabila saat sebelum serta setelah pengujian penuhi ketentuan yang sudah

ditetapkan. Riset ini mendapatkan hasil ialah ekstrak daun afrika bisa diformulasikan ke dalam sediaan gel wajah dimana penelitian- penelitian sebelumnya tidak ada yang memformulasikan ekstrak ini ke dalam sediaan gel wajah, didapat riset-riset yang dilakukan sebelumnya kebanyakan memformulasikan ekstrak daun Afrika ini menjadi sediaan gel anti kuman serta gel pengobatan luka, riset ini pula menguji kestabilan mutu fisik memakai cara *freeze thaw cycling* dengan *climatic chamber* dimana dengan metode ini waktu riset bisa di hemat dengan hasil yang optimal.

Pengamatan organoleptis sediaan gel wajah ekstrak Daun Afrika yang meliputi konsentrasi/ wujud, warna serta bau. Hasil data uji organoleptis pada ketiga resep ialah buat formula I dengan konsentrasi carbopol 0,5% mempunyai konsistensi agak kental, formula II dengan konsentrasi carbopol 1% mempunyai konsistensi yang kental dan formula III dengan konsentrasi carbopol 2% mempunyai konsistensi sangat kental. Saat sebelum penyimpanan dipercepat diperoleh hasil warna hijau pekat, berbau khas Daun Afrika dengan konsistensi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa warna dan bau sediaan gel wajah pada riset ini tidak dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi carbopol akan tetapi konsistensi sediaan sangat di pengaruhi oleh konsentrasi carbopol. Penampakan organoleptis ini tidak mengalami perubahan walaupun setelah melalui penyimpanan dipercepat pada *climatic chamber* ([Tabel 3](#)).

Untuk mengetahui apakah bahan-bahan yang digunakan dalam formulasi riset ini telah tercampur dengan rata maka diperlukan pengujian homogenitas. Sangat penting untuk mengetahui apakah zat aktif terdistribusi secara merata ataupun tidak ditemukannya partikel yang menggumpal agar efek maksimal dari sediaan dapat dicapai. Pada kaca transparan di bawah sinar dioleskan sediaan gel kemudian dilihat homogenitasnya. Ketiga formula pada riset ini sebelum serta setelah penyimpanan dipercepat memperlihatkan homogenitas yang baik serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan ([Tabel 6](#)).

Keamanan suatu sediaan topikal juga dapat diketahui dengan pengujian pH. Agar iritasi tidak terjadi idealnya sediaan topikal memiliki nilai pH yang sama dengan pH kulit. Pada riset ini ketiga formula yang dibuat tidak memenuhi Persyaratan pH yang baik dan ideal walaupun pH ketiganya masih dalam batas toleransi pH kulit yaitu 7 ([Tabel 4](#)).

Ketika sediaan gel dioleskan pada kulit maka perlu diketahui bagaimana kemampuan gel itu menyebar pada lokasi pengolesan. Dari riset

ini diketahui bahwa kemampuan daya sebar akan semakin menurun apabila kadar carbopol semakin tinggi. Semakin kental suatu sediaan gel maka kemampuannya untuk menyebar akan semakin kecil atau dengan kata lain peningkatan viskositas akan terjadi seiring dengan kemampuan daya sebar yang menurun. Pada ketiga sediaan ini diperolah hasil kalau formula I serta formula II baik sebelum ataupun sehabis penyimpanan dipercepat diperolah hasil yang memenuhi ketentuan uji daya sebar gel, tetapi pada formula III menampilkan hasil yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan terutama setelah melalui penyimpanan di percepat pada *climatic chamber* ([Tabel 5](#)).

Uji viskositas ataupun kekentalan gel dilaksanakan memakai perlengkapan viskometer dengan pembacaan pada 100 rpm memakai spindle no 3. Kemampuan tahanan berbanding lurus dengan nilai viskositas sediaan gel ([Puspitasari et al., 2018](#)) dan ini berkaitan dengan kemampuan daya sebar sediaan. Hasil pengujian menampilkan bahwa viskositas paling tinggi pada formula 3 serta viskositas terendah pada formula 1 baik saat sebelum ataupun sehabis penyimpanan pada *climatic chamber* ([Tabel 7](#)).

Gel mengerut yang mengakibatkan penampakan gel menjadi lebih kecil dan padat disebabkan karena keluarnya air dari dalam sediaan gel, pengujian sinerisis dibutuhkan untuk hal tersebut. Pada saat sebelum serta sehabis penyimpanan dipercepat sepanjang 5 siklus, ketiga formula tidak memperlihatkan terbentuknya sinerisis sehingga bisa dikatakan kalau ketiga formula memenuhi ketentuan dari segi sineresis ([Tabel 8](#)).

Hasil uji statistik dari riset ini melalui uji *wilcoxon* menunjukkan hasil $P>0,05$ yang berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil pengujian sebelum melalui penyimpanan dipercepat dan setelah penyimpanan di percepat menggunakan alat *climatic chamber*.

Riset ini dalam menguji stabilitas kualitas mutu fisik sediaan gel wajah memakai sistem *freeze thaw cycling* dengan alat *climatic chamber* dengan begitu waktu riset dapat lebih pendek dibanding bila dilakukan tanpa memakai *freeze thaw cycling* serta hasil yang optimal dapat di peroleh. Riset ini ialah terobosan terbaru khusunya buat sediaan gel wajah ekstrak daun afrika yang sepanjang ini mayoritas riset sebelumnya hanya meriset ekstraknya saja tanpa di formulasikan. Kelemahan dari riset ini ialah tidak di tambahkannya pengaroma pada komposisi formula sediaan gel wajah ekstrak Daun Afrika, serta pengujian klinis yang tidak dilakukan .

Dari ketiga formula pada riset ini, formula II ialah formula yang sangat baik apabila dibanding dengan formula I serta formula III, sebab formula II dengan konsentrasi carbopol 1% penuhi persyaratan stabilitas yang baik dari seluruh pengujian mutu fisik yang dilakukan pada riset ini ialah uji organoleptis, uji homogenitas, uji daya sebar, uji sineresis serta uji viskositas kecuali buat pengujian pH.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mada dapat disimpulkan bahwa :

1. Ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) dapat diformuliskan dalam bentuk sediaan gel wajah dengan variasi konsentrasi carbopol.
2. Kestabilan mutu fisik dari sediaan gel wajah yang mengandung ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) dengan basis carbopol, maka formula II dengan konsentrasi carbopol 1% memenuhi persyaratan uji, kecuali pada pengujian pH sediaan dimana tidak satupun formula gel yang memenuhi syarat.

SARAN

Disarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan penambahan pengaroma, pengujian daya lekat serta pengujian klinis sediaan gel wajah yang mengandung ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*)

DAFTAR PUSTAKA

Ajai, F. T., Omotoso, S. O., & Oluwafemi, J. 2016. *Evaluation of fodder plants (*

Ficus polita , Azadirachta indica and Vernonia amygdalina) for their phytochemical and antibacterial properties Evaluation of fodder plants (Ficus polita , Azadirachta indica and Vernonia amygdalina) for their phytochemica. Cogent Food & Agriculture, 114(1). <https://doi.org/10.1080/23311932.2016.1211466>

Farombi, E. O., & Owoeye, O. 2011. *Antioxidative and chemopreventive properties of Vernonia amygdalina and Garcinia biflavonoid. International Journal of Environmental Research and Public Health,* 8(6), 2533–2555. <https://doi.org/10.3390/ijerph8062533>

Mulyawan Dewi dan Suriani Neti. 2013. *A-Z Tentang Kosmetik.* <http://books.google.co.id> 2013)

Prabowo C., W., et al., 2017. *Aktifitas Antioksidan dan Tabir Surya Ekstrak Daun Afrika.* Jurnal Kesehatan. Farmasi UniversitasMulawarman. Samarinda.

Puspitasari, A. D., Intan, E., & Wardhani, K. 2018. *Evaluasi Karakteristik Fisika-Kimia Dan Nilai Spf Lotion Tabir Surya Ekstrak Daun Kersen (Muntingia Calabura L.)* Jurnal Riset Teknologi Industri, 12(2), 150.

Rowe, C. R. 2009. *Handbook of Pharmaceutical Excipients^{6th} Edition.* London : Chicago : APhA/Pharmaceutical Press.



FORMULASI DAN STABILITAS MUTU FISIK SEDIAAN GEL WAJAH YANG MENGANDUNG EKSTRAK DAUN AFRIKA DENGAN VARIASI KONSENTRASI CARBOPOL

by Dwi Rachmawaty

Submission date: 01-Apr-2022 07:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 1865208546

File name: document_6.pdf (239.26K)

Word count: 3291

Character count: 20191

FORMULASI DAN STABILITAS MUTU FISIK SEDIAAN GEL WAJAH YANG MENGANDUNG EKSTRAK DAUN AFRIKA DENGAN VARIASI KONSENTRASI CARBOPOL

*Formulation And Physical Quality Stability Of Facial Gel Preparations Containing African Leaf Extract (*Vernonia amygdalina dell.*) With Variations In Carbopol Concentration*

Dwi Rachmawaty Daswi*, Arisanty, St Mutmainnah Dewi Reski, Alfrida Monica, St. Ratnah
Politeknik Kesehatan Makassar

*E-mail korespondensi: dwialamsyah@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.32382/mfv17i2.2299>

Date submitted 2021-08-3 , Accept Submission 2021-11-17

ABSTRACT

African leaves (*Vernonia amygdalina* Del.) are plants that have benefits as natural antioxidants because it contain phenolic compounds including flavonoids that can ward off free radicals. This study aims to formulate facial gel preparations from African leaf extracts to determine the stability of the physical quality of the preparations. African leaves are extracted using the maceration method and then formulated into a facial gel made in three variations of the formula. Three gel formulas made with different carbopol concentrations are 0.5%, 1%, 2%. Physical quality testing of facial gel preparations is performed before and after the accelerated stability test (freeze thaw), including organoleptics, homogeneity tests, syneresis tests, pH tests, scatterpower tests and viscosity tests. Based on the results, formula II with 1% carbopol concentration fulfilled almost all the requirement of the physical quality test carried out before and after the accelerated stability test except for pH testing, for formula I with 0.5% carbopol concentration and formula III with 2% carbopol concentration only met homogeneity, syneresis and viscosity test requirement. The result of statistical test showed the result of $P>0,05$ which means there is no significant difference from the test results before and after accelerated storage.

Keywords : Physical quality test, facial gel, African leaf extract, carbopol

ABSTRAK

Daun Afrika (*Vernonia amygdalina* Del.) merupakan tanaman yang memiliki manfaat sebagai antioksidan alami karena memiliki kandungan senyawa fenolik termasuk flavonoid yang dapat menangkal radikal bebas. Memformulasikan sediaan gel wajah dari ekstrak daun afrika dan untuk mengetahui kestabilan mutu fisik sediaan merupakan tujuan dari penelitian ini. Daun Afrika diekstraksi dengan menggunakan metode maserasi kemudian diformulasikan kedalam gel wajah yang di buat dalam 3 variasi formula. Tiga formula gel yang dibuat dengan konsentrasi carbopol yang berbeda yaitu 0,5%, 1%, 2%. Pengujian mutu fisik sediaan gel wajah dilakukan sebelum dan setelah uji stabilitas dipercepat (*freeze thaw*), meliputi organoleptik, uji homogenitas, uji sineresis, uji pH, uji daya sebar serta uji viskositas. Berdasarkan hasil yang diperoleh formula II dengan konsentrasi carbopol 1% memenuhi hampir semua persyaratan uji mutu fisik yang dilakukan sebelum dan sesudah uji stabilitas dipercepat kecuali pengujian PH , untuk formula I dengan konsentrasi carbopol 0,5 % dan formula III dengan konsentrasi carbopol 2% hanya memenuhi persyaratan uji homogenitas, sineresis dan viskositas. Hasil uji statistik menunjukkan hasil $P> 0,05$ yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan dari hasil pengujian sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat.

Kata Kunci: Uji mutu fisik, gel wajah, ekstrak daun Afrika, carbopol

PENDAHULUAN

Obat tradisional merupakan bahan ataupun racikan bahan yang berbentuk bahan tanaman, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sari (galenik) ataupun kombinasi tersebut. Buat penyembuhan serta bisa diterapkan cocok dengan norma yang berlaku di masyarakat ([Puspitasari et al., 2018](#)). Salah satu tumbuhan

yang kerap dimanfaatkan selaku obat yaitu Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*). Di Indonesia secara empiris bagian daun tumbuhan digunakan selaku obat antidiabetes, obat antimalaria serta obat antikanker. Bersumber pada skrining fitokimia yang dicoba di Uganda didapatkan hasil kalau Daun Afrika positif memiliki alkaloid, saponin, tannin, seskueterpen laktone,

triterpenoid, asam amino, flavonoid, terpenoid, serta kardiotonik ([Prabowo et al., 2017](#)).

Daun Afrika umumnya dikenal dengan daunnya yang pahit, merupakan *semak* yang tumbuh hingga 3 meter di daerah tropis Afrika dan bagian lain Afrika, khususnya, Nigeria, Kamerun dan Zimbabwe yang terkenal memiliki beberapa manfaat kesehatan seperti efek sitotoksik terhadap sel karsinoma nasofaring manusia. Selain itu, Daun Afrika juga efektif melawan disentri amuba, gangguan pencernaan, dan memiliki aktivitas antimikroba dan antiparasit ([Farombi & Owoeye, 2011](#)).

Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) dikenal pula memiliki dampak analgetik. Sebagian saponin berguna sebagai antimikroba. Tannin sudah lama dikenal berguna sebagai adstringen gen sehingga bisa mempersempit luas cedera, adapun steroid serta flavonoid memiliki dampak antiinflamasi, sehingga luka bakar dikurangi keparahannya serta dipulihkan ([Ajayi et al., 2016](#)).

Beberapa penelitian yang lain pula menyatakan terdapatnya isi senyawa fenolik termasuk flavonoid berperan selaku senyawa antioksidan yang bisa mencegah radikal bebas yang ada dalam Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*), ekstrak metanol Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) memiliki nilai IC 50 sebesar 175, 021 ppm serta nilai tabir surya sebesar 50- 250 ppm ([Prabowo et al., 2017](#)). Salah satu aspek yang bisa menimbulkan penuaan pada wajah merupakan radikal bebas, sehingga dibutuhkan bahan ataupun senyawa yang bisa mencegah radikal bebas ini mengurangi proses penuaan pada wajah. Salah satu penangkal dampak kurang baik dari radikal bebasialah senyawa antioksidan ([Mulyawan & Suriani, 2013](#)). Meski Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) mempunyai antioksidan serta tabir surya yang lumayan besar tetapi masih sangat sedikit di manfaatkan oleh warga masyarakat buat kesehatan kulit wajah bisa jadi diajibatkan sebab penggunaannya yang kurang instan oleh sebab itu riset ini memformulasikan daun Afrika dalam sediaan gel wajah dengan konsentrasi carbopol yang bervariasi, diharapkan sediaan gel wajah Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) ini nantinya bisa di manfaatkan secara luas oleh warga masyarakat.

Dalam pembuatan sediaan cair semi solid di butuhkan *gelling agent*, carbopol ialah salah satu *gelling agent* yang biasa dipakai dalam pembuatan sediaan cair semi solid. Inert merupakan sifat carbopol, nyaman, tidak reaktif dengan komponen resep gel yang lain. Carbopol

mempunyai watak hidroskopik, bisa meresap kelembaban air serta udara. Carbopol ialah kelompok asam karboksilat 56%- 68% yang dihitung dari basis kering. Pada formulasi sediaan liquid atau semi solid biasanya menggunakan carbopol selaku suspending atau sebagai agen buat tingkatkan viskositas. Carbopol berperan selaku *gelling agent* pada konsentrasi 0, 5%- 2% ([Rowe, 2006](#)).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti bertujuan untuk memformulasikan sediaan gel wajah yang mengandung ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) serta mengetahui stabilitas mutu fisik dari sediaan gel wajah yang mengandung ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*).

METODE PENELITIAN

Riset ini ialah eksperimen laboratorium dengan membuat sediaan gel wajah serta memastikan kualitas fisik dan kestabilan sediaan gel wajah ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*). Penelitian ini menggunakan alat-alat antara lain, *beaker glass*, batang pengaduk, timbangan Analitik, sendok pengaduk (*stainless steel*), oven, *waterbath*, *mixer* serta alat-alat gelas yang lain buat analisis, *rotary evaporator*, viskometer dan lumpang serta alu. Bahan yang digunakan yakni: metil paraben, propilparaben, etanol 96%, carbopol, trietinolamin (TEA), propilenglikol, dan aquadest.

Prosedur Kerja

Pengolahan Bahan Uji

Sortasi basah dilakukan setelah Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) dikumpulkan, air mengalir digunakan untuk mencuci sampel. Sampel kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan setelah terlebih dahulu di potong-potong kecil sesuai derajat halus daun 5/8.

Pembuatan ekstrak

Bejana maserasi disiapkan, sampel terlebih dahulu ditimbang seberat 100 gram kemudian dimasukkan ke dalam bejana maserasi. Untuk merendam simplisia secara sempurna digunakan aethanol 96%. Ditutup bejana maserasi, dibiarkan selama 5 hari jangan lupa pengadukan dilakukan sese kali, bejana maserasi disimpan terlindung dari cahaya matahari. Maserat dikeluarkan setelah 5 hari, diulangi lagi hal tersebut di atas sebanyak 2-3 kali hingga sampel terekstraksi sempurna. Ekstrak kental diperoleh dengan menguapkan maserat di atas tangas air.

Pembuatan sediaan gel

Tabel 1. Rancangan Formula sediaan gel wajah ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) dengan basis carbopol.

Nama Zat	Konsentrasi (%)			Referensi
	F1	F2	F3	
Ekstrak Daun Afrika	20	20	20	10%-20% ¹
Carbopol	0,5	1	2	05%-2% ²
Trietanolamin	2	2	2	2%-4% ²
Propilenglikol	10	10	10	10%-15% ²
Metil paraben	0,18	0,18	0,18	0,02%-0,3% ²
Aquades	Ad	Ad	Ad	
	100	100	100	

Keterangan:

1. [Puspitasari, 2018](#)
2. [Rowe, 2006](#)

Pembuatan Formula

Pada riset ini menggunakan 3 variasi konsentrasi carbopol. Methyl paraben dan aqua destillata dipanaskan pada suhu 70°C, aduk hingga methyl paraben larut. Carbopol dimasukkan ke dalam campuran methyl paraben aduk hingga terbentuk massa gel. Massa gel yang telah terbentuk didinginkan. Propilenglikol ditambahkan ekstrak Daun Afrika dan trietanolamin aduk hingga homogen, kemudian masukkan campuran ini ke dalam campuran carbopol aduk hingga homogen. Aqua destillata kembali ditambahkan untuk mencukupkan gel hingga 100 gram. Wadah tertutup rapat digunakan untuk menyimpan gel. Evaluasi mutu fisik dilakukan setelah gel disimpan selama 24 jam.

Pengumpulan data

Data primer dari hasil uji mutu fisik sediaan gel wajah ekstrak Daun Afrika meliputi pengujian organoleptis, homogenitas, pH, daya sebar dan uji sineresis menggunakan metode penyimpanan dipercepat dikumpulkan .

Pengolahan Data

Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis data melalui pendekatan teoritis yang membandingkan antara hasil uji mutu fisik sediaan sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat dengan persyaratan yang ditetapkan.

Evaluasi mutu fisik dilakukan sebelum dan sesudah diberi perlakuan *freeze thaw* sebanyak 5 siklus. Evaluasi mutu fisik meliputi :

Uji Organoleptis

Pengamatan terhadap perubahan bentuk, warna dan bau dari sediaan gel wajah ekstrak Daun Afrika dilakukan sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat.

Uji Homogenitas

Bahan-bahan yang digunakan untuk formulasi sediaan gel wajah ini haruslah

terdispersi homogen. Sebanyak 0,1 gram sampel dioleskan pada kaca obyek kemudian diamati apakah bahan-bahan yang terkandung di dalamnya terdispersi merata.

Uji Stabilitas sediaan

Pengukuran pH

Alat pH Meter digunakan untuk mengukur pH pada riset ini. Ketentuan persyaratan pH untuk sediaan topikal adalah 4,5-6,5.

Uji Daya Sebar

Pada riset ini digunakan 2 buah kaca obyek dengan ukuran 20 x 20 cm, sediaan gel wajah seberat 0,5 gram dioleskan pada salah satu kaca obyek sedangkan kaca obyek yang lain digunakan untuk mengcover kaca obyek tersebut. Pemberat 125 gram ditempatkan di atas kaca obyek tersebut diamkan selama 1 menit lalu ukur diameter yang terbentuk. Ketentuan untuk daya sebar ialah 5-7 cm.

Uji Viskositas

Alat viskometer digunakan pada riset ini untuk menentukan viskositas sediaan. Di atas cone berdiameter 5 cm ditempatkan gel, *plate* digunakan untuk menghimpit sediaan gel tersebut hingga tipis namun perlu dijaga agar tidak terjadi pergesekan antara *plate* dan *cone*. Semua formula pada riset ini haruslah mengalami perlakuan yang sama sehingga perlu diatur parameter pengukuran. Penentuan viskositas ini dilakukan setelah sediaan gel di simpan selama 48 jam. Ketentuan yang ditetapkan untuk viskositas gel ialah 2000-4000 cP.

Pengujian Sineresis

Penyimpanan gel pada suhu ±10°C dilakukan untuk mengamati terjadinya sineresis. Air yang dibebaskan dari gel selama penyimpanan ini di tumpang kemudian hitung kehilangan berat yang terjadi dibandingkan

dengan berat awal gel. Tidak terjadinya sineresis selama penyimpanan menunjukkan bahwa

sediaan gel tersebut memenuhi ketentuan sineresis yang ditetapkan..

Hasil Penelitian

Formula

Tabel 2. Formula sediaan gel wajah ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) dengan basis carbopol.

Nama Zat	Bobot (gram)		
	F1	F2	F3
Ekstrak Daun Afrika	6	6	6
Carbopol	0,15	0,3	0,6
Trietanolamin	0,6	0,6	0,6
Propilenglikol	3	3	3
Metil paraben	0,05	0,05	0,05
Aquades ad	30	30	30

Pengamatan Organoleptis

Tabel 3. Hasil pengamatan organoleptis sediaan gel wajah sebelum dan sesudah uji stabilitas dipercepat selama 5 siklus menggunakan *climatic chamber*.

Formula	Organoleptis					
	Sebelum Penyimpanan		Dipercepat		Setelah Penyimpanan	
	konsistensi	Warna	Bau	konsistensi	Warna	Bau
Formula 1	Agak kental	Hijau kecoklatan	Khas	Agak kental	Hijau kecoklatan	Khas
Formula 2	Kental	Hijau kecoklatan	Khas	Kental	Hijau kecoklatan	Khas
Formula 3	Sangat kental	Hijau kecoklatan	Khas	Sangat kental	Hijau kecoklatan	Khas

Pengukuran pH

Tabel 4. Hasil pengamatan pH sediaan gel wajah sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat selama 5 siklus menggunakan *climatic chamber*.

Formula	Sebelum penyimpanan dipercepat	Setelah penyimpanan dipercepat	Persyaratan
Formula 1	7	7	
Formula 2	7	7	4,5 – 6,5
Formula 3	7	7	

Uji Daya Sebar

Tabel 5. Hasil pengukuran daya sebar sediaan gel wajah sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat selama 5 siklus menggunakan alat *climatic chamber*.

Formula	Sebelum penyimpanan dipercepat	Setelah penyimpanan dipercepat	Persyaratan
Formula 1	7	6,5	
Formula 2	5	5	5 – 7
Formula 3	6	4,5	

Uji Homogenitas

Tabel 6. Hasil pengujian homogenitas sediaan gel wajah sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat selama 5 siklus menggunakan alat *climatic chamber*.

Formula	Sebelum penyimpanan dipercepat	Setelah penyimpanan dipercepat	Persyaratan
Formula 1	Homogen	Homogen	Sediaan menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar
Formula 2	Homogen	Homogen	
Formula 3	Homogen	Homogen	

Uji Viskositas

Tabel 7. Hasil pengujian viskositas sediaan gel wajah sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat selama 5 siklus menggunakan alat *climatic chamber*.

Formula	Sebelum penyimpanan dipercepat	Setelah penyimpanan dipercepat	Persyaratan
Formula 1	2028	2375	
Formula 2	3071	3383	2000-4000 cP
Formula 3	3497	3857	

Uji Sineresis

Tabel 8. Hasil pengujian viskositas sediaan gel wajah sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat selama 5 siklus menggunakan alat *climatic chamber*.

Formula	Sebelum penyimpanan dipercepat	Setelah penyimpanan dipercepat	Persyaratan
Formula 1	Tidak terjadi sineresis	Tidak terjadi sineresis	Sineresis terjadi jika keluarannya air dari dalam gel sehingga gel mengkerut
Formula 2	Tidak terjadi sineresis	Tidak terjadi sineresis	
Formula 3	Tidak terjadi sineresis	Tidak terjadi sineresis	

PEMBAHASAN

Pada riset ini diperoleh sediaan gel wajah dengan memakai bahan aktif ekstrak Daun Afrika berdasarkan pada riset sebelumnya oleh ([Prabowo et al., 2017](#)) dimana didapatkan bahwa ekstrak metanol Daun Afrika mempunyai IC 50 sebesar 175, 021 ppm serta angka tabir surya sebesar 50- 250 ppm sehingga ekstrak daun afrika sangat potensial dalam menghambat radikal bebas yang diakibatkan oleh paparan cahaya matahari selaku pemicu penuaan pada wajah ([Prabowo et al., 2017](#)).

Melalui Riset ini dihasilkan sediaan gel wajah dari ekstrak Daun Afrika dengan memvariasikan konsentrasi carbopol 0, 5%, 1% serta 2%. Carbopol dalam resep berfungsi selaku

gelling agent. Carbopol ialah *gelling agent* yang kuat, mempunyai keasaman yang besar sehingga dalam penggunaannya selaku *gelling agent* hanya diperlukan sekitar 0, 5%- 2%.

Sediaan gel wajah dari ekstrak Daun Afrika dicoba pengujian mutu fisik pada keadaan penyimpanan dipercepat pada temperatur 5°C sepanjang 4 jam kemudian pada temperatur 35°C sepanjang 4 jam dengan kelembapan yang tetap sebanyak 5 siklus memakai *climatic chamber*, pengamatan organoleptis, uji homogenitas, uji sineresis, uji pH, uji daya sebar dan uji viskositas merupakan parameter- parameter yang diukur. Sediaan gel wajah ini dinyatakan sesuai syarat mutu fisik yang baik apabila saat sebelum serta setelah pengujian penuhi ketentuan yang sudah

ditetapkan. Riset ini mendapatkan hasil ialah ekstrak daun afrika bisa diformulasikan ke dalam sediaan gel wajah dimana penelitian- penelitian sebelumnya tidak ada yang memformulasikan ekstrak ini ke dalam sediaan gel wajah, didapati riset-riset yang dilakukan sebelumnya kebanyakan memformulasikan ekstrak daun Afrika ini menjadi sediaan gel anti kuman serta gel pengobatan luka, riset ini pula menguji kestabilan mutu fisik memakai cara *freeze thaw cycling* dengan *climatic chamber* dimana dengan metode ini waktu riset bisa di hemat dengan hasil yang optimal.

Pengamatan organoleptis sediaan gel wajah ekstrak Daun Afrika yang meliputi konsentrasi/ wujud, warna serta bau. Hasil data uji organoleptis pada ketiga resep ialah buat formula I dengan konsentrasi carbopol 0,5% mempunyai konsistensi agak kental, formula II dengan konsentrasi carbopol 1% mempunyai konsistensi yang kental dan formula III dengan konsentrasi carbopol 2% mempunyai konsistensi sangat kental. Saat sebelum penyimpanan dipercepat diperoleh hasil warna hijau pekat, berbau khas Daun Afrika dengan konsistensi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa warna dan bau sediaan gel wajah pada riset ini tidak dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi carbopol akan tetapi konsistensi sediaan sangat di pengaruh oleh konsentrasi carbopol. Penampakan organoleptis ini tidak mengalami perubahan walaupun setelah melalui penyimpanan dipercepat pada *climatic chamber* ([Tabel 3](#)).

Untuk mengetahui apakah bahan-bahan yang digunakan dalam formulasi riset ini telah tercampur dengan rata maka diperlukan pengujian homogenitas. Sangat penting untuk mengetahui apakah zat aktif terdistribusi secara merata ataupun tidak ditemukannya partikel yang menggumpal agar efek maksimal dari sediaan dapat dicapai. Pada kaca transparan di bawah sinar dioleskan sediaan gel kemudian dilihat homogenitasnya. Ketiga formula pada riset ini sebelum serta setelah penyimpanan dipercepat memperlihatkan homogenitas yang baik serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan ([Tabel 6](#)).

Keamanan suatu sediaan topikal juga dapat diketahui dengan pengujian pH. Agar iritasi tidak terjadi idealnya sediaan topikal memiliki nilai pH yang sama dengan pH kulit. Pada riset ini ketiga formula yang dibuat tidak memenuhi Persyaratan pH yang baik dan ideal walaupun pH ketiganya masih dalam batas toleransi pH kulit yaitu 7 ([Tabel 4](#)).

Ketika sediaan gel dioleskan pada kulit maka perlu diketahui bagaimana kemampuan gel itu menyebar pada lokasi pengolesan. Dari riset

ini diketahui bahwa kemampuan daya sebar akan semakin menurun apabila kadar carbopol semakin tinggi. Semakin kental suatu sediaan gel maka kemampuannya untuk menyebar akan semakin kecil atau dengan kata lain peningkatan viskositas akan terjadi seiring dengan kemampuan daya sebar yang menurun. Pada ketiga sediaan ini diperolah hasil kalau formula I serta formula II baik sebelum ataupun sehabis penyimpanan dipercepat diperolah hasil yang memenuhi ketentuan uji daya sebar gel, tetapi pada formula III menampilkan hasil yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan terutama setelah melalui penyimpanan di percepat pada *climatic chamber* ([Tabel 5](#)).

Uji viskositas ataupun kekentalan gel dilaksanakan memakai perlengkapan viskometer dengan pembacaan pada 100 rpm memakai spindle no 3. Kemampuan tahanan berbanding lurus dengan nilai viskositas sediaan gel ([Puspitasari et al. 2018](#)) dan ini berkaitan dengan kemampuan daya sebar sediaan. Hasil pengujian menampilkan bahwa viskositas paling tinggi pada formula 3 serta viskositas terendah pada formula 1 baik saat sebelum ataupun sehabis penyimpanan pada *climatic chamber* ([Tabel 7](#)).

Gel mengerut yang mengakibatkan penampakan gel menjadi lebih kecil dan padat disebabkan karena keluarnya air dari dalam sediaan gel, pengujian sinerisis dibutuhkan untuk hal tersebut. Pada saat sebelum serta sehabis penyimpanan dipercepat sepanjang 5 siklus, ketiga formula tidak memperlihatkan terbentuknya sinerisis sehingga bisa dikatakan kalau ketiga formula memenuhi ketentuan dari segi sinerisis ([Tabel 8](#)).

Hasil uji statistik dari riset ini melalui uji *wilcoxon* menunjukkan hasil $P>0,05$ yang berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil pengujian sebelum melalui penyimpanan dipercepat dan setelah penyimpanan di percepat menggunakan alat *climatic chamber*.

Riset ini dalam menguji stabilitas kualitas mutu fisik sediaan gel wajah memakai sistem *freeze thaw cycling* dengan alat *climatic chamber* dengan begitu waktu riset dapat lebih pendek dibanding bila dilakukan tanpa memakai *freeze thaw cycling* serta hasil yang optimal dapat di peroleh. Riset ini ialah terobosan terbaru khusunya buat sediaan gel wajah ekstrak daun afrika yang sepanjang ini mayoritas riset sebelumnya hanya meriset ekstraknya saja tanpa di formulasikan. Kelemahan dari riset ini ialah tidak di tambahkannya pengaroma pada komposisi formula sediaan gel wajah ekstrak Daun Afrika, serta pengujian klinis yang tidak dilakukan .

Dari ketiga formula pada riset ini, formula II ialah formula yang sangat baik apabila dibanding dengan formula I serta formula III, sebab formula II dengan konsentrasi carbopol 1% penuhi persyaratan stabilitas yang baik dari seluruh pengujian mutu fisik yang dilakukan pada riset ini ialah uji organoleptis, uji homogenitas, uji daya sebar, uji sineresis serta uji viskositas kecuali buat pengujian pH.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) dapat diformulasi dalam bentuk sediaan gel wajah dengan variasi konsentrasi carbopol.
2. Kestabilan mutu fisik dari sediaan gel wajah yang mengandung ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*) dengan basis carbopol, maka formula II dengan konsentrasi carbopol 1% memenuhi persyaratan uji, kecuali pada pengujian pH sediaan dimana tidak satupun formula gel yang memenuhi syarat.

SARAN

Disarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan penambahan pengaroma, pengujian daya lekat serta pengujian klinis sediaan gel wajah yang mengandung ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina*)

DAFTAR PUSTAKA

Ajayi, F. T., Omotoso, S. O., & Oluwafemi, J. 2016. *Evaluation of fodder plants (Ficus polita , Azadirachta indica and Vernonia amygdalina) for their phytochemical and antibacterial properties Evaluation of fodder plants (Ficus polita , Azadirachta indica and Vernonia amygdalina) for their phytochemicals*. Cogent Food & Agriculture, 114(1). <https://doi.org/10.1080/23311932.2016.1211466>

Ficus polita , Azadirachta indica and Vernonia amygdalina) for their phytochemical and antibacterial properties Evaluation of fodder plants (Ficus polita , Azadirachta indica and Vernonia amygdalina) for their phytochemicals. Cogent Food & Agriculture, 114(1). <https://doi.org/10.1080/23311932.2016.1211466>

Farombi, E. O., & Owoeye, O. 2011. *Antioxidative and chemopreventive properties of Vernonia amygdalina and Garcinia biflavonoid*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(6), 2533–2555. <https://doi.org/10.3390/ijerph806253>

Mulyawan Dewi dan Suriani Neti. 2013. *A-Z Tentang Kosmetik*. <http://books.google.co.id> 2013)

Prabowo C., W., et al., 2017. *Aktifitas Antioksidan dan Tabir Surya Ekstrak Daun Afrika*. Jurnal Kesehatan Farmasi UniversitasMulawarman. Samarinda.

Puspitasari, A. D., Intan, E., & Wardhani, K. 2018. *Evaluasi Karakteristik Fisika-Kimia Dan Nilai Spf Lotion Tabir Surya Ekstrak Daun Kersen (Muntingia Calabura L.)* Jurnal Riset Teknologi Industri, 12(2), 150.

Rowe, C. R. 2009. *Handbook of Pharmaceutical Excipients^{6th} Edition*. London : Chicago : APhA/Pharmaceutical Press.



FORMULASI DAN STABILITAS MUTU FISIK SEDIAAN GEL WAJAH YANG MENGANDUNG EKSTRAK DAUN AFRIKA DENGAN VARIASI KONSENTRASI CARBOPOL

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | RANK | SOURCE | TYPE | PERCENTAGE |
|------|---|-----------------|------------|
| 1 | garuda.ristekbrin.go.id | Internet Source | 1 % |
| 2 | eprints.ums.ac.id | Internet Source | 1 % |
| 3 | Desy Ayu Irma Permatasari, Tatiana Siska Wardani, Ikrima Rahmasari, Kezia Putri Maha Dewi. "ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PURSLANE PLANT (<i>Portulaca oleracea L.</i>) EXTRACT AS AN ANTIAGING SERUM IN SPRAY GEL USING DPPH METHOD", Jurnal Farmasi Sains dan Praktis, 2022 | Publication | 1 % |
| 4 | repository2.unw.ac.id | Internet Source | 1 % |
| 5 | Anggun Maksumah, Rifqi Ferry Balfas, Hanari Fajarini, Iqbal Yulianto. "Uji Efektivitas Sediaan Gel Sabun Wajah Ekstrak Daun Kemangi (<i>Ocimum Basilicum L.</i>) Terhadap Bakteri | | 1 % |

Staphylococcus Aureus", Jurnal Ilmiah JOPHUS : Journal Of Pharmacy UMUS, 2021

Publication

-
- 6 Kristianus Runtuwene, Paulina V. Y. Yamlean, Adithya Yudistira. "FORMULASI, UJI STABILITAS DAN UJI EFEKTIVITAS ANTIOKSIDAN SEDIAAN GEL DARI EKSTRAK ETANOL DAUN SESEWANUA (*Clerodendron squatum* Vahl) DENGAN MENGGUNAKAN METODE DPPH", PHARMACON, 2019

Publication

1 %

-
- 7 Meyla C. M. Pratasik, Paulina V. Y. Yamlean, Weny I Wiyono. "FORMULASI DAN UJI STABILITAS FISIK SEDIAAN KRIM EKSTRAK ETANOL DAUN SESEWANUA (*Clerodendron squatum* Vahl.)", PHARMACON, 2019

Publication

1 %

-
- 8 jurnalnasional.ump.ac.id

Internet Source

1 %

-
- 9 repository.stikes-kartrasa.ac.id

Internet Source

1 %

-
- 10 Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama

Student Paper

1 %

-
- 11 anzdoc.com

Internet Source

1 %

-
- repo.undiksha.ac.id

12

<1 %

13

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Surakarta

<1 %

Student Paper

14

repository.unhas.ac.id

<1 %

Internet Source

15

Submitted to Lambung Mangkurat University

<1 %

Student Paper

16

vibdoc.com

<1 %

Internet Source

17

Rallentendo Eva Lee, Elisabeth Ayudya Rini,
Siswi Astuti, Eko Yohanes Setyawan. "African-
Stevia Leaves Herbal Tea as a Low Calorie
Antioxidant Source", European Journal of
Engineering Research and Science, 2019

<1 %

Publication

18

Tri Yuni Elfasyari, Lita Riastienanda Putri,
Sawitri Wulandari. "Formulasi dan Evaluasi
Gel Antioksidan Ekstrak Daun Bidara (*Ziziphus
jujuba* Mill.)", PHARMACY: Jurnal Farmasi
Indonesia (Pharmaceutical Journal of
Indonesia), 2019

<1 %

Publication

19

arisetiadi11911.blogspot.com

<1 %

Internet Source

20	jurnal.farmasi.umi.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
22	Christian Excelino Kaunang, Widdhi Bodhi, Hosea Jaya Edi. "UJI EFEK ANALGETIK NANOPARTIKEL EKSTRAK RIMPANG JAHE MERAH (<i>Zingiber officinale</i> var <i>Rubrum</i>) PADA TIKUS PUTIH JANTAN GALUR WISTAR (<i>Rattus norvegicus</i>)", PHARMACON, 2020 Publication	<1 %
23	journal.poltekkes-mks.ac.id Internet Source	<1 %
24	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
25	librepo.stikesnas.ac.id Internet Source	<1 %
26	perpuspim.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	student-research.umm.ac.id Internet Source	<1 %
28	Thesya Manarisip, Paulina V.Y Yamlean, Widya Astuty Lolo. "FORMULASI DAN UJI EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI SEDIAAN GEL EKSTRAK ETANOL DAUN KERSEN (<i>Muntingia</i>	<1 %

calabura L.) SEBAGAI ANTISEPTIK TANGAN",
PHARMACON, 2019

Publication

-
- 29 Indriyani Arman, Hosea Jaya Edy, Karlah L.R Mansauda. "FORMULASI DAN UJI STABILITAS FISIK SEDIAAN MASKER GEL PEEL-OFF EKSTRAK ETANOL DAUN MIANA (*Coleus Scutellifoloides* (L.) Benth.) DENGAN BERBAGAI BASIS", Jurnal Farmasi Medica/Pharmacy Medical Journal (PMJ), 2021 <1 %
- Publication
-
- 30 Resti Hastuti, Srie Rezeki Nur Endah, Ali Nofriyaldi. "FORMULASI DAN UJI STABILITAS FISIK SEDIAAN GEL EKSTRAK DAUN ALPUKAT (*Persea americana*. Mill)", Pharmacoscript, 2020 <1 %
- Publication
-
- 31 ejournal.unsrat.ac.id <1 %
- Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

FORMULASI DAN STABILITAS MUTU FISIK SEDIAAN GEL WAJAH YANG MENGANDUNG EKSTRAK DAUN AFRIKA DENGAN VARIASI KONSENTRASI CARBOPOL

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
